

## البِطْرَةُ وَتِرْبَيْهُ الدِّوَابُن

### مَرْضُ الدِّفْتِيرِيَا فِي الدِّجَاجِ

استلقت نظري مقالاً نشر بمجلة الفرونساوية التي صدرت في شهر فبراير سنة ١٩٢٢ على مرض الدفتيريا، فأثرت تعريةه لفائدة القراء خصوصاً وإن هذا المرض يفتلك فتكاً ذريعاً بالدجاج فيقبل بيضها ويرتفع ثمنه كثيراً إن لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره. وقد تصرفت قليلاً فيما جاء بهذا المقال حتى يلأم الحاله الدفتيريا من الأمراض العديدة ومن اشدها فتكاً بالدجاج، ويجب ب مجرد ظهور أعراضه أن تتخذ الإجراءات الازمة باسرع ما يمكن.

اعراضه - يتغير لون عرف الدجاج من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق المائل إلى البنفسجي وهو أول ما يظهر من الأعراض، ثم يتغطي الشخص بطبيعة بيضاء أو صفراء أحياناً وتصير رائحة الفم كريهة جداً وتدمع العينان وتغطي بغشاء أصفر وتنظر على الدجاج المصاب علامات الكآبة والانكماش بويقوس ظهره ويعيل الرأس والعنق إلى جهة الصدر ويسرع التنفس وترتفع الحرارة ويقف ريش الدجاج إلى أعلى ويصدر من الصنب علية جيداً بلع مائي طوى لها، أما برازها فيصير منها يعاً ذا لون أصفر أو أخضر ويظهر على جلدتها تآليل صغيرة.

الاحتياطات والعلاج - يجب عند ظهور أول علامات المرض وضع كل فرخة على حدة في صندوق محكم السد يعمل به فتحة صغيرة تسمح لرأس وعنق الفرخة أن يبقى خارجاً عنه، ويوصل هذا الصندوق بانبوبة

تثنائي من طرفها الثاني باناء يغلي فيه مزيج من القطران وزيت التربتينا  
فيحصل بخار هذا المزيج من الانبوبة الى ريش الفرخة فيتعقم جسمها كله  
وترش حيطان وسقف الحل الذي به الدجاج بالجير المضاف اليه الليزول  
بنسبة ٤ في المائة وترش الارض بالجير الحبي او مسحوق كبريتات الحديد  
وتغسل الاواني بالماء المغلي مضافا اليه الليزول بنسبة ٤ في المائة  
الطعام - تجهز عجينة من الدقيق وتحاط بعفروم العجم وتعطى للفراخ  
صباحا ويضاف الي هذا الطعام ملعقة بن من مسحوق الكبريت لكل  
ثلاث فرخات كل يومين . ويستمر على هذا النظام مدة ستة ايام بعد  
انتهائها يستبدل مسحوق الكبريت بالمركب الآتي

مسحوق الفرفة      ٣٠ جرام

»      الزنجبيل      ١٠٠ جرام

»      الجنبيانه      ١٠ جرام

زهر الليس      ١٤ جرام

كربونات الحديد      ٥٠ جرام

ويضاف من هذا المركب علي الطعام المذكور سابقا ملعقة بن لكل  
عشرة فرخات . ويضاف الي ماء الشرب حامض السكلوريدريات بنسبة  
٥ و ١ سنتيمتر مكعب للتر من الماء ويغسل الفم والاعين بواسطة خرقه  
ممغمرة في محلول من برومنجانات البوتاسيت وبالطبقة البيضاء الموجودة  
في الفم وتزمع بمحكمها بقطعة من الخشب مع الاحتراس من جرح الفم  
واذا حصل جرح اثناء نزع هذا الغشاء فلا يجب دهانه بصبغة البو

ويوصي السيو ميجنا بدهان الفم والزور والانف بفرشة صغيرة تغمر

في العسل الاسود ويرش عليها قليل من مسحوق الكبريت وهذا الدهان  
يقوم مقام الغسيل بالبرمنجات  
ويستمر هذا العلاج لمدة من ٨ الى ١٥ يوما  
اما طعام الظهر فيكون من اللبن الرايب المضاف اليه قليل من  
مسحوق الفحم ويتم هذا العلاج باعطاء ملعقة بن اربعه مرات في اليوم  
لكل فرخة من محلول الآتي لمدة عشرة أيام  
عصير الليمون ٣٠٠ سنتيمتر مكعبا

ملحق الطعام	١٠ جراما
سلفات الصودا	١٠ جراما
عسل أبيض	١٥ جراما
سكرات الجير	٣ جراما
فينول	٣٠ جراما

ويجب على من يباشر علاج الدجاج المصاب أن يغسل يديه بمحلول  
مطهر بعد مسكة لفراخ حتى لا تنتقل العدوى الى مكان آخر  
وقد بين المسيو كادييه العالم البيطري أنه لا ضرر من أكل الدجاج  
المصاب بعد عام استواه

عبد العزيز نصار

المساعد الفني بقسم الكيمياء

بوزارة الزراعة