

تقويم الحديقة

حديقة الخضر

سبتمبر و اكتوبر

الخرشوف : يمكن في النصف الاول من شهر سبتمبر زراعة
الخرشوف اذا لم يكن قد تم ذلك في الشهر الماضي ، هذا مع العلم أنه كلما
بكر في زراعته كلما جاء المحصول مبكراً ، ولا يخفى أهمية ذلك . ومما
نلفت اليه الانظار في هذا الصدد أيضاً العدول عما ألفه بعض المزارعين
من تجزئ النباتات القديمة الى قطع صغيرة ، فان نسبة كبيرة من الاجزاء
الصغيرة لا تثبت أو يكون نبتها ضعيفا ، ويترتب على ذلك نقص المحصول
علاوة على التأخير في إعطاء الرؤوس .

البسلة : تزرع عروة بدرية من البسلة في شهر سبتمبر، وعروة أخرى
في شهر اكتوبر ، وتزرع الانواع الطويلة في الجهة البحرية من مصاطب
عرضها مائة وعشرين سنتمترًا ، أما الانواع القصيرة فتزرع على متون
بعدها عن بعضها ثمانية سنتمترًا . وفي كلتا الحالتين يكون البعد بين الجورة
والأخرى نحو الخمسة وعشرين سنتمترًا . وقد يكون من المناسب (خوفاً
من تعفن البذرة اذا تلاصقت ببعضها الخمسة أو الستة في جورة واحدة) أن
تزرع البذور منفردة تبعد الواحدة عن الأخرى نحو الثلاثة سنتمترات في

الجهة البحرية الممتون أو المصاطب في الجزء العلوي منها وذلك بعدرى الأرض وجفافها قليلاً بحيث تصالح لانبات البذرة وتخف النباتات في هذه الحالة إذا وجدت ضرورة لذلك . وبما أنه وجد أن محصول البسلة القصيره يساوى في وزنه محصول الطويلة وأن القصيرة أسرع إزهاراً وأثماراً فيحسن والحالة هذه أن يستغنى بها عن الطويلة وذلك لما تتكلفه الأخيرة من أحطاب تتسلىق عليها وأجرة غرس هذه الدعامات

الفول الرومى : تزرع عروة مبكره من الفول الرومى أثناء شهر سبتمبر

وعروة اخري في أكتوبر . والاصناف المعروفة بمصر نوعان : الفول الرومى الابيض والفول الرومى الاسود ، ويوجد نوع ثالث قرونه طويلة اسمه الاجوادلش الا ان محصوله قليل بالنسبة للنوعين الآخرين . وقد وجد أن الفول الرومى الاسود يعطى محصولاً اكبر من الابيض ونباتاته اكثر تفرعاً ، لهذا فانه يحتاج الى مسافة أوسع عند الزراعة ، فيزرع الفول الأسود في جور البعد بين الواحدة والأخرى ثمانون سنتمتر او الابيض على بعد ستين سنتمتر بين الجورتين . ويجب تمهيد تربة الحياض وجعلها مستوية ويوضع في الجورة بذرتان أو ثلاثة متباعدة عن بعضها حتى اذا تعفنت لا يمتد ذلك الى المتلاصقة بها . وتزرع البذور بعدرى الأرض وجفافها جفافاً مناسباً . ويزرع بعضهم محصولاً مؤقتاً من السبانخ أو الفجل بين صفوف الفول . وفي هذه الحالة يزرع الفول في الجور كما قدمنا ثم تبذر السبانخ أو الفجل نثراً وتغطى بقليل من التراب ثم يروى الجميع دفعة واحدة الشليك أو الفراوله : قد لوحظ أن زراعة الشليك في شهر أغسطس بصيها بعض الضرر من ارتفاع درجة الحرارة في هذا الشهر مما يتسبب

عنه موت كثير من النباتات المنزرعة . فقد شوهد غيظا شديدا بالحيزة وقد ماتت فيه اكثر النباتات المنزرعة قبلى المتون ولم يصب النباتات المنزرعة فى الجهة البحرية من المتون اذى ، وقد اراد المزارع مقاومة تأثير الحرارة الشديدة بزيادة الري فأدّى ذلك الى نمو خضروى عظيم للنباتات التى لم تمت ، ولكن المحصول رغم ذلك كان أقل من محصول زراعة شهر سبتمبر بكثير لان الاخير سلم من تأثير الحرارة الشديدة ونجحت اكثر نباتاته .

لذلك نرى من الأوفق زراعة الشليك فى النصف الاول من شهر سبتمبر فى تلك المناطق

الكرنب : يزرع فى شهر سبتمبر أو أوائل اكتوبر اخر عروة من الكرنب التى زرعت بذرته فى الشهور السابقة

القنبيط : يزرع فى سبتمبر العروة المتوسطة المسماة بالطوبى ويزرع فى اكتوبر شتلة القرنبيط الوحى أو الامشيرة

الكرنب أو البطه : تزرع البذرة وتشتل فى أى وقت خلال هذين الشهرين

الفاصوليا : تزرع الفاصوليا فى شهر سبتمبر لتؤكل قرونها خضراء ، ولكن لا تترك للحصول على البذور الجافة فان الطقس البارد يحل قبل تمام نضج القرون ، ويمكن زراعة عروة متأخرة فى اكتوبر مع البسلة فتزرع الأخيرة على الجانب البحرى من المصطبة التى عرضها متر وعشرين سنتمترا (بسلة طويلة) وتزرع الفاصوليا على الجانب القبلى من المصطبة

البطاطس : يزرع في سبتمبر البطاطس الشتوى الذى يعطى محصوله في شهر ديسمبر قبل دخول الصقيع ، وفي شواطئ البحر الابيض - جهة الاسكندرية - قد يزرع البطاطس في شهر اكتوبر أيضا

الكرفس : تزرع بذرة الكرفس في سبتمبر و اكتوبر للحصول على نباتات تستعمل أوراقها في الحساء (الشوربة) ويمكن نقل الشتلة الكبيرة في سبتمبر الى متون سبق تسميد تربتها جيداً بسجاد الاسطبلات المتعفن الكرات أبو شوشه . يمكن نقل الشتله في شهر سبتمبر على جانبي المتون التى بعدها عن بعضها ستون سنتمرا

البصل . تزرع بذرتة في شهر سبتمبر لنقل الشتله في شهرى ديسمبر ويناير وكذلك يمكن زراعة البصيلات الصغيرة في سبتمبر للحصول على البصل الاخضر

السيباخ . تزرع أوام عروة من السباخ البلدى في شهر سبتمبر وتستمر زراعته أثناء شهر اكتوبر

البنجر . تزرع العروة الاولى في شهر سبتمبر وتستمر الزراعة في شهر اكتوبر ، هو إما يبقى في الحياض التى زرت بها البذور أو تنقل الشتلة لزراعتها على متون وذلك للحصول على رؤوس كبيرة

الجزر الافرنجى تزرع البذرة في أى وقت أثناء هذين الشهرين ، إما نثر في حياض أو في خطوط تبعد عن بعضها بقدر ١٥ سنتمرا . والجزر من الحاصلات التى تجرد بكثرة التسميد وانقار الخدمة

الشكوريا والهندباء . تزرع بذرتهما في هذين الشهرين ، وتنقل الشتلة

عند ما تبلغ حجماً مناسباً إلى متون تزرع على جانبيها
الحس تزرع بذرتها في شهرى سبتمبر و اكتوبر وتنقل الشتلة بعد

زراعة البذرة بنحو شهر

الفنوكيا تزرع البذرة أثناء هذين الشهرين وتنقل الشتلة متى بلغت

الحجم المناسب لتزرع على جانب واحد من المتن

السليق تزرع البذرة في حياض نثراً باليد أثناء هذين الشهرين

الطماطم تنقل إلى مصاطب في اكتوبر لتعطي محصولاً في الربيع

الجزر الأبيض والسلسفيل تزرع البذرة في سبتمبر و اكتوبر، ويجب

عدم التأخير في ذلك حتى تنضج الجذور قبل اشتداد الحرارة

الخبازى والكذبرة والشبت تزرع بذور هذه الأنواع في سبتمبر

و اكتوبر في حياض نثراً باليد

المقدونس تزرع بذره في أي وقت أثناء هذين الشهرين

الجرحير والفجل والخردل يمكن زراعتها في أي وقت

اللفت الأبيض، تزرع عروة منه كل شهر

منير بطرس

مساعد في تقسيم البساتين