

تقويم الفاكهة

سبتمبر و اكتوبر

النخيل ، يمكن استمرار زراعة النخيل خلال شهر سبتمبر ، وتنتخب لذلك الفسائل المتوسطة الكبر لان نسبة كبيرة من الفسائل الصغيرة تموت بعد نقلها ، والنخيل من أنواع أشجار الفاكهة القليلة التي تنجح زراعتها في مختلف الاراضي ، فأنة ينجح في الاراضي الضعيفة أو التي بها نسبة ليست كبيرة من الاملاح الضارة ، ويحسن عند نقل فسائل من أرض حلوة الى أرض ضعيفة الملوحة أن لا تزرع في مكانها الدائم مباشرة ، بل تفرس مبدئياً في جزء من هذه الارض على ان يكون بعد الفسيلة عن الاخرى متر او تتعهد الري مدة سنة حتى تعتاد الوسط الذي يقل في جودته عن الوسط الذي نقلت منه ، ويحسن في الاراضي الرملية المفككة بنوع خاص أن ينتخب للزراعة الفسائل الكبيرة ، ويزداد عمق الجورة التي تفرس فيها الفسيلة كلما كانت هذه كبيرة على شرط أن لا تعمق الحفر لدرجة يكون من الممكن معها تسرب الماء الى قلب النبات فيتعفن قبل أن يبدأ في النمو ، ويجب في الفسائل المنقولة أن تلف قممها النامية لفا محكما بالخيش حتى لا تموت -

تكاثر الموالح . في شهر سبتمبر تمضج ثمار الليمون البلدى وعلى ذلك

يجب انتخاب الثمار الكبيرة التامة النضج ليستخرج منها البذور و تزرع ، ويمكن زراعة هذه البذور في شهر سبتمبر إما في مواجير أو في صناديق تملأ من طمي النيل ، هذا اذا كانت كمية البذور صغيرة والا فانها تزرع في حياض ضيقة عرضها نحو النصف متر ، و يزرع في الحوض سطران على بعد

أربعين سنتيمترا من بعضهما ، وينتخب للحياض أرض صفراء قوية تحرث
حرثا عميقا ويفرش عليها طبقة من الرمل الناعم أو طمي النيل ، وبعد بذر
البذور تغطي بطبقة أخرى سمكها نحو السنتيمترين ثم تروى . وفائدة الرمل
منع تشقق سطح الأرض وهذا يحفظ البذرة من التعرض لاشعة الشمس
التي إن وصلتها قد تقضى على قوة أنباتها . ويجب تعهد هذه الحياض بالرى
بحيث لا يصيبها الجفاف أبدا . وبعد انبات البذرة يغطي النبات باحطاب
القطن أو أوراق النخيل أو الشراخ الخشبية لوقايتها من برد الشتاء والصقيع
ويمكن حفظ البذرة في الرمل حتى تزرع في شهر مارس

أما شتلة الليمون البلدى والارنج المنزرعة بذورها في مارس الماضى
فيمكن نقلها من حياض البذرة الى المشتل في أول أسبوع من شهر سبتمبر
إذا كانت الشتلة قد بلغت الحجم المناسب للنقل ، وقبل النقل تشبع حياض
البذرة في الماء الغزير حتى لا تتقطع جذور النبات كثيرا اثناء العملية ، وتزرع
الشتلة في حياض مستوية خصوصا إذا كانت الأرض عرضة لتزهير الاملاح
على سطحها . وتغرس الشتلة على بعد خمسين الى سبعين سنتيمترا من بعضها
ويحسن ان تكون مرتبة صفوفها منتظمة البعد بينها سبعون سنتيمترا وذلك
يسهل الحرث لاستئصال الحشائش . وقد آن للمزارع المصرى ان
يستعاض عن الشغل اليدوى باستخدام المواشى والآلات في الاحوال
التي يمكن فيها ذلك لما في ذلك من تقليل النفقة وكثرة الكسب ،
ويحسن أن يغرس في كل جورة شتلتان حتى اذا ماتت واحدة بقيت
لاخرى فلا يظل مكانها بورا لا ينتفع به في المشتل مدة طويلة .
وإذا لم تكن الشتلة قد بلغت الحجم المناسب للنقل فيؤجل ذلك الى

مابعد الشتاء ، ويجب في هذه الحالة تسميد الشتلة بنترات الصودا بمعدل خمسين كيلو جراما للفدان ليزداد نموها .

وان كانت نباتات النارنج التي نقلت الى المشتل في مارس الماضي قد بلغت الحجم المناسب للتطعيم فيمكن اجراء ذلك في شهر سبتمبر و اكتوبر فيطعم عليها أنواع اليوسفي والبرتقال اما أنواع الليمون فيحسن تطعيمها على أصول من الليمون المالح وفي هذين الشهرين أيضاً يمكن الاستمرار في اجراء عملية تطعيم الموالح التي لم ينجح طعمها في الشهور السابقة ولكن لا يوضح الآن قطع الاصول الناجح طعمها من أعلي الزر المطعوم به بل يجب ارجاء هذه العملية لبعده انقضاء فصل الشتاء

الجوافة . تمضج ثمار الجوافة في شهر سبتمبر وعلى ذلك تنتخب منها الانواع الجيدة اللذيذة الطعم الكبيرة الحجم لاستخراج بذرتها ، وترجع هذه البذرة في صناديق أو مواجير أو حياض بنفس الطريقة التي تكلمنا عنها في زراعة الليمون البلدى

التوت . تزرع بذرة التوت في شهر سبتمبر في الارض بنفس الطريقة التي شرحناها في زراعة حياض الليمون هذا اذا لم يكن قد تم ذلك في شهر ابريل الماضي -

الحلويات . يمكن الاستمرار في اجراء عملية التزوير (التطعيم بالعين) للحلويات في شهر سبتمبر ، وقد يمكن تطعيم النوع الواحد من الفاكهة على أكثر من نوع واحد من الاصول ولكن وجد بالاختيار أن الاصول التي من نوع الطعم تفضل غيرها ؛ ولزيادة الايضاح نقول أن الخوخ مثلاً ينجح

تطعيمه على أصول من الخوخ أو البرقوق أو اللوز أو المشمش أحيانا ولكن شاهدنا أن الخوخ المطعوم على أصول من الخوخ البذرة أشجاره أقوى وأحسن وأقل عرضة للأمراض من المطعوم على أصول من نوع آخر، وكذلك المشمش يمكن تطعيمه على برقوق أو مشمش ولكن المطعوم منه على المشمش البذرة أقوى وأفضل من المطعوم على البرقوق، وعملا بهذه النظرية التي تتفق مع الطبيعة تطعم الاصناف الجيدة من البرقوق على البرقوق الأمريكاني أو البلدي، وتطعم أنواع الخوخ الجيدة على الخوخ البذرة والمشمش الجيد الحموي وغيره على المشمش البذرة والسفرجل الرومي على السفرجل البلدي وأنواع الكثرى الأمريكاني على الكثرى البذرة وأنواع التفاح الجيدة على التفاح البذرة أو التفاح البلدي واللوز الفرل على اللوز ذى القشرة السميكه أما البشملة فاصعوبة انبات بذرتها يمكن تكاثرها بتطعيمها على السفرجل البلدي عند عدم توفر البشملة البذرة وفي كل هذه العمليات لا يصح قطع الاصول فوق الازرار المطعومة الناجحة قبل انتهاء فصل الشتاء. وإذا لم يكن وقتها قد نجح تطعيم بعض النباتات بالعيز أجرى التطعيم بالقلم في شهر فبراير.

الرى: نظرا لانخفاض درجة الحرارة في هذين الشهرين عن الشهور السابقة يمكن إطالة الفترة بين الريه والاخرى اللهم الا في أشجار الكاكي والتين والقشطه فانها تروى كالمعتاد نظرا لأحتياج ثمارها الى الماء لتأخذ حجمها الطبيعي، ويروى المزارعون في مديرية الفيوم أشجار الليمون البلدي والزيتون والعنب مرة في الشهر أثناء هذين الشهرين

الافات . في شهر اكتوبر ترش نباتات المنجو الصغيرة بمحلول بر دو

حتى لا تصاب بندوة المنجو

منير بطرس

المساعد الفني بقسم البساتين