

تقويم الحديقة

حديقة الفاخرة

مارس - ابريل

الغرس - يمكن نقل أشجار الموالح وغرسها في الجور المعدة لها ان لم يكن قد نقلت في الشهر الاضى ويمكن في هذه الحالة نقلها ملشا وقبل اجراء عملية النقل تجرد الشجرة من جميع أوراقها وتقليم أطرافها وتستأصل الفريعات الصغيرة وليلاحظ دائما عند الغرس أن لا يدفن الطعم تحت سطح الارض خصوصا اذا كان الاصل نارنج

ولذلك يجدر بصاحب الحديقة أن يراعى عند شراء أشجاره أن يكون الطعم على ارتفاع مناسب على الاصل

المانجو - يمكن نقل أشجار المانجو في شهر مارس ويلزم أن تنقل بصلاية كبيرة تحوى جميع جذورها ويلزم الاعتناء الزائد بصلاية الشجرة حتى لا تتفكك لان ذلك مما يودى بحياتها. وبعد الغرس يمكن تغطية النبات زربية من حطب الأذرة حتى تتأصل جذوره في الارض وعند ذلك يرفع الغطاء تدريجاً

ويجدر بنا أن نذكر هنا أن المانجو توجد في الارض الطينية الخفيفة الحسنة الصرف والحفاظة للرطوبة فكل محاولة لزراعتها في غير هذا النوع من التربة محكوم عليها بالفشل. وتزرع أشجار المانجو عادة على بعد قصبتين من بعضها وتزرع أشجار من الجوافة بين أشجار المانجو وتستأصل أشجار الجوافة عند ما تبلغ المانجو من الحجم ما لا يسمح ببقاء أشجار الجوافة بعد ذلك

النخيل - يمكن غرس فسائل النخيل في هذا الوقت وليلاحظ أن الفسائل كلها كانت كبيرة في الحجم كلما بكرت باعطاء محصولها

ويلزم عند الغرس مراعاة النقط الآتية :

١ — ان لاتكون النقطة النامية تحت سطح الارض والاعتفت من الرطوبة ومات النبات

٢ — اذا كانت لارض طينية ثقيلة يلزم وضع مقطف أو اثنين من الرمل في كل جورة ليساعد ذلك على سهولة نمو الجذور

٣ — في الاراضى الرملية يجب أن تغرس الفسائل بعيل جهة الشمال حتى اذا هبت الريح لاتكون سببا في تقليعها

٤ — يجب لف الاوراق والزر النامى بقطعة من الخيش أو الحصير أو خلافة كوقاية لمنع التبخير المتوالى من النبات قبل تأصله فى التربة وتزال هذه الوقاية متى تأصل النبات

٥ — يجب أن تقلم جميع الاوراق الجافة قبل الغرس

ويجمل بنا أن نذكر ان أحسن وقت لزراعة الفسائل هو شهر اغسطس حيث يكون الجو معتدلا والماء متوفرا أما الزراعة فى شهر ابريل فشائعة فى الجهة الشمالية من الوجه البحرى كدمياط ورشيد حيث أن قرب البحر من هذه الجهات من أكبر العوامل فى تاظيف حرارة الجو عند دخول أشهر الصيف على الفسائل المزروعة حديثا

ومن الامور الجديرة بالملاحظة ان أشجار النخيل تجود فى أنواع من الاراضى قما تجود فيها أشجار أخرى من الفواكه فتجود فى الاراضى الرملية والاراضى الموجودة بها نسبة معينة من الاملاح ويزرع النخيل على بعد قسبتين فى الغالب الموز : يغرس الموز فى شهرى مارس و ابريل ويلاحظ ان الفسائل تكون كبيرة الحجم حتى يمكن الحصول على محصول مبكر وأما المسافة بين الاشجار فتكون قصبية

ومن الامور الهامة في زراعة الموز أن يراعى أن لا تكون الارض المجهزة لزراعته قد زرعت بمحاصيل الخضار قبل ذلك لمدة سنة أو سنتين على الأقل وخصوصا ما كان منها من انواع السكرنب والقرنبيط والبنجر أو ماشا كل ذلك وهي التي تصاب عادة بالدودة الثعبانية

(الثماتودا) ويحسن في هذه الحالة زراعة الارض ببذور الغلال حيث ان نباتاتها فلما تصاب بهذه الدودة الفتاكة واذا عرفنا ذلك لاندعش كثيرا من أن نرى أن الموز المنزرع بمحاصيل الاسكندرنية لا يخلو من هذه الآفة حيث أن أصحاب الحدائق كثيرا ما تزرع الموز بعد محاصيل الخضار

والموز من النباتات التي تحتاج الى عناية كبيرة فلا يوجد الا في الاراضي الرملية أو الخفيفة ويحتاج الى ماء كثير وكمية وافرة من السماد البلدى القديم وعند الفرس يجب أن يلاحظ أن تكون النباتات خالية من الامراض ويزرع الموز الهندي في العراق وذلك لقصر سيقانه أما الموز البلدى فيزرع في الاماكن البعيدة عن الرياح الشديدة

الزراعة

تزرع بذور النارج والليمون البلدى والقشطه والباباظ في شهرى مارس وابريل وتغطى أحواض البذرة بشرايح خشبية أو بجر يد النخل لوقاية النباتات الصغيرة من حرارة الشمس الشديدة

وتزرع بذور التوت بعد أخذها من الثمار مباشرة أو تحفظ في الرمل لتزرع في اغسطس وتزرع البشملة بمجرد فصلها من ثمارها في قصى نمره ١٠ وكذلك يمكن زراعة بذور الجوافة في مواجير أو صناديق أو في أحواض بالارض كما تزرع بذور الطرابلس كذلك في أحواض

تزرع عقلة البرقوق والليمون الحلو والترنج والتين والسفرجل في أوائل مارس ان لم تكن قد زرعت قبل ذلك أما عقلة العنب والرمان فيجب ان لاتتأخر

لتزرع في شهر مارس ويلاحظ ان يداوم في رى أرض العقلة بعد زرعها
لضمان نجاحها

التزير

يبدأ في تزير أشجار الموالح التي لم ينجح تطعيمها قبل الشتاء أو التي
تركت بدون تطعيم نظرا لصغر حجمها . والنباتات التي ينجح تطعيمها تقرر الى
ما فوق الزر بعشرة سنتيمترات

التسميد

يمكن تسميد الأشجار الكبيرة في مارس وابريل بالاسمدة الازوتية والسما
البوتاسي اذا لم تكن قد سممت هذه الأشجار بالسما البلدي أو سما الاصطبلات
في شهر يناير الماضى لعدم توفرهما في ذلك الوقت وانما يلاحظ هنا ان يكون
بين التسميد بهذين السمانين فترة لا تقل عن ١٥ — ٢٠ يوما

وقد يعطى السمان الازوتى لحيطان البذرة أو لنباتات المشتل لتشجيعها
على النمو

الرى

في هذا الوقت تكون أشجار الموالح مزهرة وبذلك يجب عدم ريه حتى
ينتهى تزهيرها وتبتدىء في عقد ثمارها ويجب أن تروى المنجو قبل التزهير
وتراعى أشجار المشمش والخوخ بالرى بعد عقد ثمارها وكذا يروى البرقوق في أوائل
مارس قبل التزهير ثم تروى بعد ذلك في أبريل بعد عقد الثمار ويراعى ريه بعد ذلك
وكذلك لا يروى العنب الا بعد عقد الثمار وتروى القشطة والجوافة في منتصف
شهر مارس لأول مرة بعد الشتاء . ويمكن رى السكاكى واللوطس في مارس قبل
التزهير . كذلك يمكن رى التفاح والكثيرى في شهر مارس قبل التزهير

الآفات

تصاب أشجار الخوخ والمشمش والبرقوق والرمان بالندوة العسلية في شهر
ابريل . وأحسن علاج لها أن ترش بمحلول الكنتكلا
وتصاب ثمار الرمان بدودة الرمان المسماة « فيراكولاليفيا » ولوقاية الثمار
توضع في أكياس من الخوص حتى لا يضع فراش الدودة بيضه على الثمار
ويصاب كذلك التفاح والسفرجل والرمان بحفار الساق ويجب اباده هذه
الحشرة بادخال سلك في الثقب حتى يصل الى الدودة ليقتلها أو يضغط في الثقب
ثاني كبريتور الكربون

ويجب الاحتراس الشديد من عدم تبخير أشجار الموالح في شهر مارس لان
الاشجار في هذا الشهر تكون عليها الازهار فاذا أجريت هذه العملية فلا بد
من تساقط هذه الازهار وبذلك يتلف المحصول

مصطفى الزبادى

