

حدائق الخض

في

شهرى مايو ويونيه

(الهليون) : — يستمر جمع الهليون حتى أوائل يونيه اذا كان قد نضى سنتان على زراعته المستديمة اما اذا كان العهد بزراعته أكثر من ذلك فيستمر الجمع حتى شهر يوليه . ويلاحظ اتباع الارشادات السابق ذكرها في الاعداد السابقة في الاعتناء بجمع سوق النباتات القوسية النمو وترك الرفيعة منها بدون جمع لتكون فرخاها وائماً تمدقصر النبات بالغذاء فيقوي ويكبر في الحجم ويعطى محصولاً أكبر وأغزر في الاعوام المقبلة

هذا واذا كان هنالك محاصيل مغلة مؤقتة قد زرعت مع الهليون كالفاصوليا أو البصل (وهذا مما لا أشير على المزارعين باتباعه) فانها تحصد في مايو وعقب حصادها تسمد خطوط الهليون بالسماد البلدى أو أزوتات الصودا لانها تزيد في نمو النبات وقوته

ويلاحظ كذلك في حياض بندور الهليون المزروعة في الشهرين الماضيين أن تنظيف جيداً من الحشائش وان تخفف البوادر بحيث يترك بين الواحدة والاخرى قدر عشر سينتمترات

أما نباتات الهليون التي نقلت الى الزراعة المستديمة في هذا العام فلا ينبغي أخذ محصول منها مطلقاً

(الباذنجان والقليل) : — تشتل بوادرها من الصنفين المزروعة بندرة في

الشهرين الماضيين . وهذه النباتات لا تثمر الا في شهر يولييه .
وتظهر في مايو ثمار العروس المزروعة بذرتها في أكتوبر ونوفمبر
وديسمبر وهى الزراعة البورية للباذنجان والفلفل العروس
هذا ويمكن فى هذا الوقت زراعة بذور الفلفل البلدى والباذنجان

الاسود اذا اريد نقل بوادرهما فى الخريف وتعقيرهما فى الشتاء المقبل
ومن المستحسن دائما التبكير فى شتل الباذنجان الطلياني والفلفل
الرومى فى الشهرين الماضيين حتى يمكن الحصول منها على ثمار قبل حلول
فصل الشتاء . لانه ليس ثمة فائدة من تعقيرهما لان ذلك يؤدي الى صغر
حجوم اثمارهما واهتلاثهما بالبذور الكثيرة فضلا عن اكتسابهما طمها
مراذير مقبول وكل ذلك ينافى الغرض الذي زرعا من أجله فى الحشو
والسلطة وفى شهر مايو والشهر الذي سبقه تظاهر ثمار الباذنجان والفلفل
العمر وتباع بأثمان مرتفعة

ملاحظة : -- عندما تبدأ نباتات الباذنجان والفلفل فى الأثمار براعى
ان تعطى كفايتها من الماء مع تكرار العزيق واستعمال الحشائش وأخصبها
بالذكر الهلوك ويلاحظ كذلك جمع الثمار متوسطة الحجم بأن لا تكون
متناهية فى اصغر ذات طعم مر ولا ان تكون كبيرة تسبب تعجزا
للنباتات وتعطيلا لأثمارها

الكرنب والقنبيط : — تزرع بذورهما الآن فى حياض جيدة
التسميد ويلاحظ الاعتناء بريها وعدم الاكثار من ذلك حتى لا يزداد
نموها بحالة تجمعها غير صالحة معها للشتل فيما بعد ويرى من ذلك ان فى تقليل
الماء عنها فائدة لها اذ يشتد نموها ويسرع نبتها وتزرع فى مكانها الدائم

ويلاحظ مثل ذلك في البذور المزروعة في الشهر الماضي
ويكفي الفدان الواحد لزراعته من نصف الي ثلاثة ارباع كيلو
جرام بذرة

كرنب بطه والخرفش والاحمر : - يشرع في شتل بوادرها ابتداء
من الآن في خطوط عدتها من ٥ الي ٦ في القصبه الواحدة

كرنب أبي ركبته وبروكسل : - يمكن زراعة عروة من بذور أبي ركبته
وكرنب بروكسل أو شتلها . فتقل بوادر أبي ركبته على جانبي متون عددها
سته في القصبه ويترك بين النبات والآخر ٢٠ سنتيمترا . أما كرنب
بروكسل فتزرع بوادره على جانب واحد من التين على بعد ٤٠ - ٥٠ سنتيمترا
من بعضها في متون عددها خمسة في القصبه

الفاصوليا : - يمكن الاستمرار في زراعة الفاصوليا اذا اريد ذلك
الملوخية : يستمر في زراعتها في هذين الشهرين في حياض اعني
بتجهيزها وتسميدها

ويلاحظ في الملوخية المزروعة في هذا الوقت أن لا يؤخذ منها أكثر
من حشتين أو ثلاث وبعدها يحسن تجديد الزراعة حتي بذلك يتسني للزارع
الحصول على نباتات غضة الاوراق نضرة الاخضرار
هذا وتهي بلغت النباتات نموا ملاماً ترش بأزوتات الصودا أو بالسما
الكفري لزيادة نضرتها وخضرتها

الرجلة : زراعتها كالملوخية ويحسن تجديد الزراعة بدلا من أخذ
عدة حشات منها

السبانخ: يزرع منها الآن النوع الهندي والنيوزيلاندي والفيروفلاي والجبلي في حياض جيدة التسميد أما النوع البلدي فيستحسن عدم زراعته الآن لميل نباتاته الى تكوين زهور فينور

وللحصول على سبانخ باستمرار تكرر زراعته كل شهر . ويمكن أيضا زراعة السبانخ كحصول مؤقت بين نباتات الطماطم البطاطه : يستمر في زراعة البطاطة ويستحسن أن يكون الغرس مبكرا ما أمكن

الطماطم : تظهر في مايو ثمار الطماطم المزروعة في يناير وفبراير وتباع بأعلى الأثمان . ونظرا لاشتداد الحر في هذا الوقت يحسن تنطية النباتات بحطب الذرة لدرء الحرارة عنها

كذلك يمكن الآن زراعة بذور الطماطم في حياض جيدة التسميد لشتائها بعد ٤٠ — ٥٠ يوما الى مكائها المستديم

الكوسة : يستمر في زراعة الكوسة بنوعيها الاسكندراني والبلدي والكوسة أحد الزروع التي لا تحتاج الى ماء كثير قبل دور الأثمار واشد آفة تصيبها هي مرض البياض فيعيق نمو النبات ويضعفه والطريقة المثلى لدرئه هي تعفير الاوراق بالكبريت بين آونة وأخرى للوقاية . ويلزم الفدان الواحد من ٢٠ — ٤٠ كيلو جراما من الكبريت ويلاحظ لانمام فائدة هذه العملية أن تزال الحشائش التي توجد في الارض كلسان الحمل وغيزها لانها كثيرا ما تصاب بالبياض وتكون واسطة في انتقال المرض الى الكوسة

البطيخ: تنتهي في مايو زراعة البطيخ في غير أرض الجزائر بالطرق التي مر ذكرها في العدد الفائت . ويظهر في مايو البطيخ البدرى المزروع في شهر نوفمبر الماضي ويباع في هذا الوقت بأعلى الأثمان أما نباتات البطيخ المزروعة في الشهرين الماضيين فيلاحظ رشها بمسحوق الكبريت اتقاء مرض البياض ويلاحظ كذلك خف النباتات التي كبرت وظهرت بها الثمار حتى بذلك ينسحق لها المجال لتحمل ثمارا كبيرة وتنمو نحو امطر دا

ومما تجدر الإشارة اليه ملاحظة الاعتناء بري البطيخ المسقاوي ربا بأعتدال فإن كثرة العطش الذي يعقبه الري الكثير يؤدي الى عدم انتظام نمو الثمار وتشققها وفسادها

السنطاوي: تنتهي زراعته في مايو وأحسنه ما زرع بجواجر الجبال والارض الرملية وأشهر الجهات لزراعته في ضواحي التاهرة في كنفير الجاموس والخانكة

ويحتاج هذا المحصول لري كثير متى كانت تربة الارض خفيفة رملية وتجهز أرضه للزراعة بتقسيمها الى مصاطب كل ثلاثة منها في القصبة ويجعل بعد النباتات عن بعضها ٧٠ سنتيمترا

اللوبياء: يمكن زراعتها هذين الشهرين ونحو العروة المزروعة في هذا الوقت ازرع من المزروعة في مارس وموعد حصادها متقاربان تقريبا ويستحسن دائما نظرا لتعرض نباتات اللوبياء للاصابة بمرض الصدأ أن تنتخب الاصناف المنيعة ضد الصدأ كالنوع الذي استحدثه قسم البساتين بوزارة الزراعة

الكرفس:- يجب الاعتناء بنظافة الحياض المزروعة بها بذرة الكرفس حتى تنمو البوادر نموا حسنا يجعلها أهلا للشتل في شهر يوليه وقد وجد بالتجارب في قسم البساتين أنه لو نقلت بوادر الكرفس من حياضها الآن في متون بحيث تجعل في جانبي المتن على بعد ١٠-١٥ سنتيمترا بين البادرة والاخري ثم يعاد شتلها لمحلها الدائم في يوليه لكان نموها أقوى مما لو شتت دفعة واحدة

القلقاس : تم زراعة القلقاس في مايو في الاحوال المتأخرة اذ ان بعض الزارعين يزرعونه بعد حصاد الشعير والبقول

ويلاحظ الاعتناء بتجهيز الارض وتسميدها الي غير ذلك مما سبق ذكره في الاعداد الفائتة ويستحسن عدم زراعة محاصيل مؤقتة مع القلقاس وان كان قد زرع شيء منها في الزراعة البدرية فانها تحصد في مايو كالملوخية والفجل والخيار كما يفعل زارعو المنوفية

أما في الزراعة البدرية للقلقاس التي تمت في الشهرين الماضيين فيلاحظ فيها الآن العزيق المتوالي ولف النباتات بعد كل عزقة بطيئة من الري حتى تصبح في آخر عزقة في وسط المتن . ويلاحظ كذلك الاعتناء بري القلقاس . ولا ينبغي الاكثار من الري الآن الا متى خرجت جميع العيون وقوي النبات فتتصرف فترة الري اذ ذلك

البطاطس : يوافق الآن حصاد البطاطس الصيفية المزروعة في أواخر يناير ويعرف أوان الحصاد عندما تجف أوراق البطاطس كلها . وتستخرج درنات البطاطس بالفأس ويلاحظ الاعتناء في استخراجها بعدم تجريحها ثم يفرز السليم منها من المعطوب

الفجل : يمكن زراعة الفجل البلدي والرومي الأحمر في مكان مظلل
رطب وتزرع البذور صرا في صفوف تبعد عن بعضها من ١٥ إلى ٢٠ سنتيمترا
في حياض صغيرة وتروى الأرض عقب الزراعة وتخف النباتات متى كبرت
الشوليك : تكثر ثماره في هذين الشهرين وتباع بثمان منخفضة
وتستمر النباتات في الأثمار حتى شهر يولييه ويلاحظ دائما موالاته نباتاته
بالري لان تعطيش النباتات يضر بها
الخس : يزرع الآن منه الرومين والتوجه فقط وتلزم زراعة البذور
في مكانها الدائم بدءا من شتل في محل مظلل

صاديق رفته جرجس

مساعد في قسم البساتين بوزارة الزراعة
