

حد يقة الخضر

في

شهرى يوليه وأغسطس

يوافق في هذين الشهرين زراعة كثير من الخضر الصيفية لا سيما المهم منها كالكرنب والقرنبيط والكرفس والبنج وتزرع هذه الخضر بمساحات واسعة في ارجاء القطر :

الهلينون : - يستمر في جمع الهليون حتى آخر شهر يوليه في الزراعة المستديمة التي مضي عليها اكثر من عامين وبعد ذلك يوقف الجمع وتترك جميع السوق الارضية لتكون فرخا هو ائيا يحمل اوراقه وازهاره الباذنجان والفلفل : - يمكن زراعة البزور في يوليه ليمتسني شتاء في

أواخر اغسطس واولئ سبتهبر وهذه العروة هي التي تستمر نباتاتها في الشتاء ليؤخذ منها المحصول العقر في الربيع القادم . وتجدر الاشارة الي أن الثمار الناتجة في الخريف من هذه العروة تفوق كثيرا في جودتها ونضارتها الثمار الناتجة من نباتات الربيع التي تكون قد أنهكتها الحر والحق بها ضررا يذكر

الخرشوف : - يبدأ بزراعته في شهر اغسطس ويلاحظ لدى تجهيز الارض للزراعة ان تسمد جيدا بخليط من السماد البلدي والكمياوي لانه ثبت من التجارب ان ذلك يساعد في تبكير نضج الرؤوس فضلا عن زيادة عددها ويلاحظ وقت الزراعة ان تجزأ النباتات القديمة الي اجزاء كبيرة

وان تُغرس في المتون اثناء غمرها بالماء بحيث تكون الاجزاء الحاملة للبراعم
جهة المن والاجزاء المجروحة الي الخارج ثم يعادري الارض بعد اسبوع
ريبا خفيفا خوفا من تعفن النباتات ثم يروي الارض وقت الحاجة متى بدأ
النبات في النمو

القردون : - يثقل ارن من البزرة المزروعة في ابريل ومايو وزراعته

كالخرشوف تماما

الكرفس بنوعيه : - تثقل الان بوادره المزروعة ببزرة في يناير

وفبراير في متون عدتها خمسة في القصبه ويزرع النوع الابيض (بسكال)
علي جانب واحد من المن والبلدي علي جانبيه

كرات ابو شوشه : - تُغرس الشتلة خلال هذين الشهرين في متون

كل خمسة منها في القصبه علي الجانبين وهذه الشتلة ناتجة من البذرة
المزروعة في يناير وفبراير

الكرنب والقنبيط : - تثقل بوادرهما المزروعة بذرة في ابريل ومايو

في هذين الشهرين ويمكن كذلك زراعة عروة جديدة من بذورهما الان
وهذه العروة تثقل فيما بعد لتكون المحصول المتأخر . وتجهز الارض الي
متون كل أربعة في القصبه وبعد النباتات عن بعضها لا يقل عن تسعين
سنتيمترا .

كرنب بروكسل وبطه وابو ركبہ الخ : تثقل نباتاتها الآن ويحسن

التبكير في الشتل ما امكن خوفا من اصابتها بحشرة المن في اواخر الصيف
ويمكن أيضا تجديد زراعة عروات من أبو ركبہ

اللوبياء والفاصولياء : يمكن الاستمرار في زراعتها وبالاخص اذا

أريد أخذ بنور جافة منهما لان هذا الوقت أوفق لهذا الغرض
الخيار : - تزرع في هذين الشهرين عروة الخيار النيلى بطريقتيه
المعروفتين .

الخس : - يبدأ زراعة جميع أنواعه في أواخر أغسطس فما يليه لتكون
معدة للشتل بعدئذ . أما خس لا توجه فيمكن نثر بنوره في شهر يولييه دون
شتائها . ويلاحظ في هذا الوقت اجراء الزراعة في مكان ظليل خوفا من
شدة القيظ .

الكوسة : يستمر في زراعة نوعها الاسكندراني والبلدى
الشوليك : يبدأ زراعته في أواخر أغسطس وينبغي الاعتناء التام
بتجهيز الارض جيدا بالسماذ البلدى القديم وتقسيمها الي متون عدتها
خمسة في القصبه وتجزأ النباتات القديمة الي اجزاء كبيرة مناسبة وتفرس
على جانبي المتن على بعد ١٥ - ٢٠ سنتيمترا من بعضها ويلاحظ موالاترى
الارض حتى يبدأ النمو في النباتات وبعد ذلك تروي حسب الحاجة

القاوون والبطيخ : يزرع الآن النوع النيلى منهما المعروف بالدميري
البطاطه : تنتهى بانتهاء هذين الشهرين زراعة البطاطة ولا يجوز
التأخير الى ما بعد ذلك خوفا من تأذي المحصول بالبرد

الباميا : يستمر في زراعتها والثمار الناتجة من هذه العروة تكون احسن
بكثير من الثمار الناتجة من زراعة الربيع لان هذه الاخيرة تتأثر كثيرا من
الحر . هذا والعروة المزروعة في هذا الوقت يمكن تعقيرها في الشتاء لاخذ
محصول مبكر منها في الربيع القادم

البصله: يكثر زراعتها في أواخر أغسطس لاسيما للأصناف القصيرة منها
البطاطس: يشرع في زراعة المحصول المعروف بالشتوي في أواخر
أغسطس وفي سبتمبر ويستحسن التبريد ما أمكن خوفا من تأذي
الدرنات بالصقيع

الطماطم: تشتل في هذا الوقت نباتاتها المزروعة بذرة في الشهرين
المنصرهين وهذه الزراعة تعرف بزراعة « الخريف » وتثمر نباتاتها في
نوفمبر وديسمبر

البصل: تزرع بذوره في أغسطس لتشتل في أواخر يناير إذا أريد
الحصول على البصل الأخضر فتزرع البصلات المعروفة بالبزور وهي التي
تكون قد حيزت من محصول السنة الماضية وكذلك يمكن زراعة البصل
المقور للحصول على البصل الأخضر في أوائل فصل الشتاء

محاصيل ثانوية: يوافق في هذين الشهرين موعد زراعة بذور اللفت
والسبانخ والفجل والبقدونس والجرجير والسلق كما تزرع في آخر أغسطس
بذور البنجر والجزر لاخذ عروة بدرية منهما

صادق رفته جرجس

مساعد في بقسم البساتين بالجيزة

