

## حديقة الازهار

تبتدىء الآن الحوليات الصيفية بالازهار وهى تحتاج للرى الغزير  
ويحسن قطف جميع الازهار قبل تفتحها اذا أن تركها على النباتات وهى  
ضعيفة ويسبب اضعاف هذه النباتات ويقصر فصل التزهير . ومما يحسن  
عمله اقتلاع جميع النباتات التى تخالف لون أزهارها اللون المرغوب بقاؤه  
حتى لا يحصل تلقيح بواسطة الحشرات من نبات لآخر يختلفان عن  
بعضهما في لون أزهارها وتزرع بذور الحوليات الشتوية في شهر يولييه  
عادة وتثر البذور نثرا خفيفا في قصار او مواجير أو صناديق كما أشرنا  
الى ذلك في العدد السابق . وتمزج البذور الصغيرة بالرمل حتى يمكن  
توزيعها توزيعا مناسباً أثناء النثر . وتوضع القصاري أو الصناديق في مكان  
مظلل حتى تنبت البذور ثم تنقل تدريجاً للإماكن المعرضة للشمس . ويحسن  
ري القصاري بعد الانبات في الصباح وقبل الغروب والامتناع عن ريهـا  
عند اشتداد الحر اذ أن ذلك يؤثر عليها تأثيراً سيئاً . وتفرد النباتات  
الصغيرة في قصار نمرة ٥ او نمرة ٨ مـي بلغت حجماً مناسباً . ويراعى ري  
القصاري قبل التفريد حتى تبقى التربة لينة ويبقى جزء من الطين ملتصقاً بجذور  
النباتات الصغيرة ومـي تم التفريد توضع القصاري الصغيرة داخل الصوبا  
في مكان مظلل بضعة أيام قبل تعريضها للشمس

اما الحوليات الوتدية الجذور كالأشوتزيا وأبي النجوم وأبي خنجر

فيحسن زرعها مباشرة في محلاتها المستدعة اذ انها تتأثر كثيراً من النقل  
وتحتاج نباتات السهراريا الى عناية خاصة فتفرد الشتلة حينما تكون

مكونة من ثلاثة أوراق ويراعى عند التفريد ان تؤخذ النباتات بصلاية صغيرة من الطين ملتصقة بالجذور وهنا تظهر فائدة نثر بنور السنراريانرا خفيفا عند الزرع اذ يسهل أخذ النباتات بصلاية حول جذورها - وتجري عملية التفريد بواسطة عصاة صغيرة مدببة وأحسن القصاري لتفريد السنراريانرا قصارى نمرة ٥ وتغلا القصارى بمخلوط مكون من جزء من السبلة المتعفنة جيدا وجزئين من طمي النيل - وهذا المخلوط يجب تحضيره بمدة شهر على الاقل قبل التفريد وتمريضه للشمس وتقليبه من وقت لآخر

ويراعى عند تفريد السنراريانرا الى القصاري الصغيرة ان تعرس مرتفعة بقدر الامكان فانه اذا غطى الثرى والماء قلب النباتات الصغيرة كان سبباني موتها . وبعد التفريد توضع القصارى في مكان مظلل تطلق الهواء . وتروى السنراريانرا قبل التفريد بكنكة لها رشاش ذي ثقب صغيرة ولكن متى فردت يجب عدم استعمال الرشاش عند الري بل تروي بالكنكة مباشرة وأحسن الطرق للري ان توضع قطعة من الخزف فوق سطح الثرى قرب حافة القصرية ويصب عليها الماء باحتراس اذ لو ابتلت الاوراق القريبة من الثرى لالتصقت به وتطرق اليها الفساد

ومتى نمت النباتات الصغيرة وامتلات القصاري بجذورها تنقل الى قصار نمرة ١٥ ثم الى قصار نمرة ٢٥ اذا اريد ترهيرا في القصاري او تنقل من القصاري نمرة ١٥ الى الارض مباشرة في حياض اما اذا اريد الحصول على نباتات ابداع ما تكون ازهارا فتنتقل هذه النباتات من القصارى نمرة ١٥ الى حياض للتربية تسمد جيدا بالسبلة المتعفنة وتعرس النباتات على بعد ٦٠ سنتيمترا عن بعضها وعند ما تبدأ في التزهير

تنقل الي قصار نمره ٣٠ او نمره ٣٥ بانتشاء زائد بصلاية حول جذورها  
ومتي تم النقل توضع القصارى بجانب بعضها في مكان مظلل تماما ويجب  
أن تجرى عملية النقل في المساء حتى لا تتأثر النباتات من حرارة الطقس  
عند النقل . وبعد ان يرجع للنباتات روتةها تفرد القصارى عن بعضها  
وقد تصاب نباتات السنرايا بدودة القطن التي تلتهم أوراقها التهاما  
وأحسن الطرق لبادتها ان تنقى باليد يوميا وهى صغيرة او ازالة اللطم  
بمجرد ظهورها

وتحتاج نباتات الاراول لعناية كبرى في هذا الوقت فاذا أريد زهريها  
في القصارى فتقل الي قصارى نمره ٢٥ ان لم يكن قد تم نقلها الآن بالطريقة  
التي أشرنا اليها في العدد السابق اما اذا أريد زرعها في الحديقة فتعزق الحياض  
وتسمد بالسبلة المتعفنة قبل النقل ويراعى ازالة جميع الافرع الجافة والضعيفة  
وتسند الافرع القوية الى دعائم من الخشب يجب ان لا يزيد ارتفاعها عن  
النباتات حتى لا يشوه منظرها . واذا أصيبت نباتات الاراول بالمن قشر  
بمحلول الصابون الرخوف في الصباح مبكرا أو عند الغروب ويجب امالة  
القصارى على جوانبها حتى لا يسقط المحلول على التربة فتتأثر منه الجذور  
ولا تحتاج نباتات الورد في شهري يوليه وأغسطس الابدوايتها بالري  
وتنقية الحشائش من وقت لآخر وتسمد في أواخر يوليه أو في شهر أغسطس  
اما بسماد الاصطبلات المتعفن جيدا أو بثرات الصودا والاخير يساعد  
على اعطاء زهر كبير الحجم

وتعزق المسطحات المعدة لزراعتها جازون جيدا وتسمد حتى يصير  
معدة للزراعة في شهر اكتوبر اما مسطحات النجيل واليبيا فانها تكون

في كمال نضارتها في ذلك الوقت وتحتاج للري الغزير وتنقية الحشائش منها  
وتقص من وقت لآخر وترقع الفراغات حتى لا يشوه منظرها ما

عزيز يعقوب

المساعد الفني بقسم البساتين