

حدیقة الزهور

لشهر نوفمبر وديسمبر

تنقل الآن الأزهار الشتوية إلى الحياض المعدة لها إن لم يكن تم نقلها من قبل وهذه الحياض تعزق جيدا وتسمد بالسبلة المتعفنة التي تخلط جيدا بالتربة - أما الحوليات التي تم نقلها فقد بدأت بالأزهار فراعى ربيها باعتدال وتقطف الأزهار الذابلة من وقت لآخر وبذا يتحول

الغذاء للازرار الزهرية الاخرى فيشجعها على النمو - وموالات قطف
الازهار الذابلة يطيل موسم التزهير اما اذا تركت فانها تسرع في تكوين
البذور التي تتمتع كثير امن الغذاء الممد للازهار الحديثة - وتعزق الحياض
كلما وجد بها حشائش

وتزرع الاك نباتات الكلار كيا والاسكشولتزيا وابي النوم والوجوديتشيا
ويمكن زرعها في اما كنها المستديمة مباشرة - اما اذا زرعت في قصارى
فلا تنثر البذور نثرا ثم تفرد متى تم انباتها كما هي الحال في باقى الحوليات
الشتوية بل يوضع عدد قليل من البذور في قصارى صغيرة (نمرة ١٠)
ثم تخف بعد الانبات الى نبات واحد اذ ان هذه الحوليات تتأثر كثيرا من
التفريد وهذا ينطبق على جميع الحوليات الوتدية الجذور

تنقل نباتات السزاريا الى الحياض المعدة لها اذا اريد تزهيرها في حياض
والتي يجب أن تعزق جيدا وتسمد بالسبلة المتعفنة قبل نقل النباتات اليها
او تنقل الى قصارى نمرة ٢٥ اذا اريد تزهيرها في القصارى ان لم يكن تم
نقلها من قبل - اما اذا اريد الحصول على ازهار كبيرة الحجم بديمة المنظر
فتنقل النباتات من القصارى نمرة ١٥ الى نمرة ٣٠ او نمرة ٣٥ فتجد جذور
النباتات مكانا فسيحا لنموها - والبعض ينقل النباتات من القصارى نمرة ١٥
الى حياض مخصوصة مسمدة جيدا ويغرسها على بعد ٦٠ سنتمرا بين كل
نبات وآخر وقبل البدء في التزهير تنقل الى قصارى نمرة ٣٠ أو نمرة ٣٥
باعتناء وبصلاية كبيرة وتجري عملية النقل عند الغروب - ثم توضع
القصارى في مكان مظلل طلق الهواء وتسمد بمنقوع السبلة كل اربعة أو خمسة أيام
وقد تصاب السزاريا بريقة تلتهم اوراقها التهاما وافضل علاج تنقية

الديدان الصغيرة في الصباح مبكرا وعند الغروب

وتزهر الاراولا في اواخر شهر اكتوبر الا انها الآن في كمال
نضارتها فاذا اريد الحصول على ازهار كبيرة الحجم تزال جميع الازرار
الزهرية بحيث لا يبقى على كل قرع الازرين او ثلاثة وتزال جميع السرطانات
التي تظهر بكثرة على سوق النباتات وتقرط دعائم الغاب المسند عليها
تلك الافرع بحيث لا يزيد طول الغاب على طول النباتات حتى لا يشوه
منظرها واذا اصبحت الاراولا بالمان فترش بماء ساخن بمضخة يد اما اذا
كانت الاصابة شديدة فترش بمحلول الصابون كما اسلفنا ذلك في عدد
سابق ويكون الرش في الصباح أو عند الغروب وتوضع القصارى مائلة
على جوانبها عند الرش حتى لا يسقط المحلول على التربة فتمتصه الجذور
ولعدم تأثر الازهار باشعة الشمس التي تذهب بألوانها النضرة توضع
القصارى في مكان كثير الظل طلق الهواء - وعند انتهاء التزهير الذي
يمكن اطالته بقطف الازهار الذابلة تقرط النباتات وتترك حتى شهر
فبراير او مارس فتؤخذ منها عقل او تفصص الجذور لتكون نباتات للعام المقبل
ويحتاج الورد لان ينظف من الحشائش ويوالى بالرى وتقطف
منه الازهار الذابلة

هذا وتستخرج درنات الداليا من الأرض وتدفن في الرمل للعام
المقبل وكذا تجمع بذور الداليا امرياليس في شهر نوفمبر ويراعى تجفيفها
في الشمس فلم تخزنها. وتزرع عقل اشجار الزينة كالكورتن والبتسيوروم
توييرا والتكوما تحت الزجاج وكذا تزرع الآن بذور النخيل كالكوكس
اللاتانيا والپرتشارديا من عزريعقوب مساعدا اختصاصى بقسم البساتين