

حد يقة الخضر

(يناير وفراير)

الهيون : كمشك الماز . يبدأ بشتل النباتات الناتجة من البذرة (التي زرعت في مارس الماضي) على خطوط تبعد عن بعضها من ١ - ٢٠ مترات
أما النباتات القديمة التي قرطت في ديسمبر السابق فتعثر أرضها (مع مراعاة عدم اتلاف النباتات) وتسمد بالسماد البلدي القديم «مقطف فوق كل نبات» ثم تفتح الخطوط وتمسح بحيث يعمل الترتيب لتغطية النباتات بطبقة من التراب فوق السماد سمكها ٢٠ - ٢٥ سنتيمترا
ثم تروى الأرض غزيرا - ويبدأ بنمو النباتات في فبراير ولا يفين عن الذهن ملاحظة ترقيع الجور الغائبة ووضع علامات بجوارها حتى لا ينجى منها شيء في عامها الأول . وتنتج الكيلو من البذرة الجيدة نحو ٢٠٠٠ شتلة، ويحتاج الفدان من ٤٠٠٠ - ٤٥٠٠ نبات - وكلما روعى تسميد الهيون وتغطيته بالتراب جيدا كلما أمكن الحصول منه على نباتات جيدة بضاء فضية

وفد تزرع الفاصوليا واللوبياء والبصل مع الهيون لمحصول مؤقت في العام الأول

الكرفس والكراث ابوشوشة : — تبذر البذور في حياض طولها

نحو ٥١ مترا معزوقة ومسمدة جيدا بالسماه البلدى ويمكن شتل النباتات الناتجة ابتداء من يولييه ويراعى في الكرفس عدم نقل النباتات المزهرة في أحواضها وأحسن انواع الكرفس البلدى والفرنساوى. ويلزم الفدان نحو كيلو من البذرة الجيدة. ويشتل الكرفس البلدى على جانبي الخط على بعد ٢٥ - ٣٠ سنتيمترا. وأما فرنساوى فعلى جانب واحد على بعد ٥٠ سنتيمترا

أما الفدان من الكراث فيحتاج لنحو ٣ كيلو من البذرة الجيدة أى نحو ١١ الف نبات وزرع على جانب الخط على بعد ٢٠ سنتيمترا تقريبا .

السبانخ — لو زرع النوع البلدى الآن فإنه يقوم بالزهر مباشرة

ولذلك يجتنب زراعته ويمكن زراعة الفيروفلى Virofay

البطاطس — يجب التبرير بزراعة البطاطس خوفا من تأثر المحصول بحرارة الصيف وإذا كانت الدرنات كبيرة فيحسن شقها . وأما إذا كانت غير ذلك فيجب زراعتها كماهى ويفضل تفريد الدرنات في مكان هوأوه طلق . ظليل وطب حتى يخرج البراعم « الميون » فاذا ما بلغ طولها نحو سنتيمترا يجب زراعتها خوفا من تكسر البراعم

البصل : يبدأ بزراعة (البندق) الشتلة التى زرعت بذورها في أوائل

الخريف ابتداء من شهر يناير في المديرية الجنوبية . وأما الشمالية فابتداء من شهر فبراير وتشتل على جانب الخطوط على بعد ١٥ سنتيمترا تقريبا

ويمكن زراعة البصيلات بعد تقويرها من الاعلى . وذلك للحصول منها على بذرة .

الحس : يمكن نقل شتلة النوع البلدى وغيره في أوائل يناير لتعطى محصولاً متأخراً أما اللاتوجا والروبين فيمكن زراعة بذرتيها في الاحواض مع مراعاة خفها كلما احتاج الامر لذلك . ولا تنقل النباتات اذا زرعت في هذا الاوان .

الفجل الرومى : تزرع البذرة على دفعات حتى يؤخذ منها محصول مستمر ويمكن نقل الرؤوس على خطوط للحصول على بذرة منها اللفت . لا يزرع النوع البلدى الآن لأن النباتات تقوم بزهرها ولا يمكن زراعة الانواع البيضاء قبل فبراير ومنها لفت أبيض ميلان

Turnip White Milan ولفت شجوا Turnip Shogio

الفاصوليا . يبدأ بزراعتها في مصر الوسطى بعد اليوم العشرين من شهر يناير ويحسن زراعتها من جانب واحد على الريشة القبلية للخطوط التي تبعد عن بعضها بنحو ٦٥ سنتيمترا . وقد يغرس بعض المزارعين بصلا على الريشة الأخرى كحصول مؤقت - وأحسن أصناف الفاصوليا التي تزرع للحصول منها على قرون خضراء هي الزهرة والبلدى

اللوبيا - يبدأ بزراعتها في أواخر شهر فبراير وهذا العروة من اللوبياء البلدى تأتي بمحصول أوفر من التي تزرع في يوليو و اغسطس لأن الأخيرة تكون عرضة للاصابة بمرض الصدأ . وقد وجد نوع من ذى النقطة السوداء يعرف بالRust Immune Lubir يزرع في قسم البساتين بالجيزة وهو لا يصاب بالصدأ الملوخية . تزرع الملوخية في الجهات الجنوبية ابتداء من شهر يناير

وتغطي احواضها بالجريد لتدفئتها . وتقلع نباتات هذه العروة بجذورها
أما العروات الأخرى المتأخرة فتحش ويمكن الحصول على ٤ - ٥ حششات
مع مراعاة التسميد والرى

الطماطم . تشتمل النباتات الناتجة من البذرة التي زرعت في الخريف
على الريشة القبلية لتكون عرضة لحرارة الشمس - وتملأ الخطوط بالسماذ
البلدى وتردم وعند بدء الطماطم بالتزهير تفتح الخطوط بحيث تصير
النباتات على الريشة البحرية ثم تروى الارض بعد ذلك

الفلفل والباذنجان . تقرط النباتات (المتروكة لتعقيرها وهي من الانواع
عادة) في يناير ثم فبراير تسمد لتعطى محصولها في مارس وثمار هذه العروة
هي المعروفة بالعمق وتباع بثمان مرتفع ولو أنها صغيرة الحجم وذلك لظهورها
مبكرة في السوق وتنقل شتلة العروة العروس في شهر فبراير وتلك
الشتلة ناتجة من البذرة المنزعة بالاحواض في الخريف ومحصول هذه
العروة يعرف بالعروس

ويمكن زراعة البذرة في فبراير في أحواض ٥×١ متر مسمدة
جيدا للحصول منها على نباتات يمكن زراعتها بعد ذلك في الصيف
الباميا : تزرع ابتداء من شهر فبراير وقد تزرع قبل ذلك في المديرىات
الجنوبية أما في الجهات الجنوبية فتزرع بعد فبراير ويفضل الاوريون
الصنف الرومى في الشراء عن البلدى ولو أن الاخير أحسن مذاقا
القلقاس . يبدأ بزراعة المحصول البدرى في أواخر فبراير ويستمر

في الزراعة حتى شهر مايو في باطن الخط ويزرع على المصاطب محصول
كالبصل والفاصوليا والخيار واللوبيا الخ ثم بعد نمو نباتات القلقاس تلف

الخطوط حتى تصبح النباتات في وسط المصاطب لتكون كورمات جيدة والقلقاس نبات يحتاج لكثرة التسميد والرى حتى يأتي بمحصول وافر وهو من النباتات المغذية ويمكن تخزينه في أرضه حتى الاحتياج اليه

الكرنب والقربيط . يمكن شتل نباتات أنواع الكرنب البطة للحصول منها على محصول في زمن الصيف أما الكرنب البلدى فتمتدحبه الرؤس الجيدة وتقطع وتنقل الجذور للحصول منها على بذره

أما القربيط فيراعى خف الازهار المتروكة للبذرة من نباتات تمتدحبه ويلاحظ رش أزهارها هي وأزهار الكرنب المتروكة للبذرة اذا أصيبت بالمن بمحلول السكتا كيلا ولكن اذا اعتنى بها وقطفت قمها فلا تؤثر فيها اصابة المن كثيراً اذ أن قطف القمم يساعد على نضج القرون مبكراً قبل أن تقوى الحشرة على الفتك بها

ابور كبه . يمكن زرع البذرة ثم خف النباتات - ويمكن الشتل اذا وجدت النباتات الصغيرة - وبواسطه التجارب التي عمات في قسم البساتين فقد أمكن الحصول على بذرة من ابى ركه بمصر ولكن لم يحقق حتى الآن نبات صفاتها

الفصيله القرعيه . يمكن البدء بزراعة نباتات الفصيله القرعية

(البطيخ . الخيار . القورع . الشامام المعجور الخ) ابتداء من شهر فبراير ويحسن تبويت البذرة ينقعها في الماء لمدة ١٢ ساعة ثم تنشل وتوضع في قطعة من الخيش أو القماش وتوضع في كوم سماد أو قش أو برسيم حتى اذا ماظهر نبتها تكون الارض مجهزة فتزرع ويلزم تسميد الارض جيداً خصوصاً اذا وجد سماد زبل الحمام ولا يفين عن الدهن رش النباتات في با كورة

الصباح بمسحوق السكر بت منعا لمرض البياض وذلك على ثلاثة أدوار
اثناء نمو النباتات في طورها الأول ويوضع المسحوق في قطعة من الشاش
ويضرب عليها فينفذ منها الى النباتات