

تقويم الازهار

(يناير وفبراير)

الآن تدخل أغاب نباتات الازهار الشتوية في دور التزهير فلحفظ رونقها واطالة مدة ازهارها تقطف منها الازهار الذابلة ليسمح لغيرها بالظهور وتوالى أرضها بالرى وتسمد وتعزق خفيفا. اما اذا كانت منزرعة في اصص (قصارى) فتسمد بمنقوع السبلة مرة كل اسبوع (بنسبة ٣-٤ مقاطف في نصف برميل ماء) بمد تفكيك سطح تربتها بالشقوف

و في أوائل يناير تزرع الأراولا (السكرينانثيموم) من الخلفة الجديدة التي تنمو حول النباتات القديمة بأن تفصل كل حلقة على حدة وتزرع في اصيص صغير عمرة ١٠ مملوء بمخلوط مركب من جزء من الطمي مع جزئين من الرمل الابيض الناعم. وتوضع في مكان مستقر أو في صوبة خشبية لوقايتها من الذبول قبل مد جذورها وعودتها ثانية للنمو، وتسمد السنانير بمنقوع السبلة أو اليودريت مرة كل اسبوع الى أن تبدأ في التزهير واذا اصيبت أوراقها باليرقات فتنهى باليد مرة أو مرتين في اليوم

وتزرع في الصوب الزجاجية المدفأة عقل الكروتن والمالوكا
والبتسبورم والمفايرنم والتكوما كبنسز وتعمل هذه العقل عادة من
أطراف الفروع الغضة

وكذلك تزرع البجونيا والجلوكسينيا اما بالدرنات الجذرية واما
بالاوراق وفي الحالة الاخيرة توضع الاوراق على الثرى منبسطة بعد شق
أعصابها من أسفل وتثبيتها بحصاة فيخرج درنات صغيرة على الاعصاب
كل منها لو فصل وزرع في أصيص صغير على حدة كَوْن نباتا منفصلا .
وبعضهم يزرع الورقة منتسبة بفرز ذئبها في الثرى بعد قطع نصفها
الا على فتتكون الدرنة الجذرية في أسفل الذئب ومنها ينمو النبات

وتروى البجونيا والجلوكسينيا في مبدأ الأمر باعتدال حتى تبدأ في
النمو فتروى بغزارة ولما تقرب من دور التزهير تسمد خفيفا بمنقوع السبله
وايضا تزرع عقلة الديغمباكيا والسكوليوس والبرايبوفيلام
والسكلانكور والسكلانكو والجاروينا والبلارجونيوم

وفي أواخر يناير وفي فبراير تزرع عقل بعض أشجار الخشب والظل
وشجيرات الزينة والاسيجه والمتسلقات أما في اصص نمره ٢٠ أو ٢٥
واما في الارض على جهة واحدة من متون على حساب تسعة متون
في القصبتين وعلى بعد ٢٠ سنتيمترا بعضها من بعض الى أن تبلغ ارتفاعا
مناسبا فتنقل الى مكانها المستديم الا في حالة الاسيجه فنزرع في محلها
الدائم مباشرة في خطين متبادلين على بعد ٢٥ سنتيمترا بين العقلة والاخرى
ومثل هذه العقل لا تحتاج لتدفئة صناعية لمساعدتها على النمو وتعمل بطول
٢٠ - ٢٥ سنتيمترا تقريبا وتغرس مائلة الوضع بحيث لا يظهر منها فوق

سطح الارض اكثر من زرا أو زرين وما يمكن تكاثره من أشجار
الخشب والظل بهذه الكيفية هو التكو ماستانزو والحور والبروسونيشيا
بايريرا . والألياجنس هورتنسز (الباج الافرنكي) والاريترينا اندكا
(المرجان الهندي) والمالكو أورانشيا كالوالصنصاف البلدى وأبو الشعور
والرفيع . والفلفل ذو الورق العريض (شينص تونتيڤوليوس) ومن
شجيرات الزينة والاسيجة بنت القنصل . والبديا . والا كايفا .
والبو تيلون والليجوسيرم والهبرطامس والكليرون دندرن انمس والكليرون
دندرن اكيوليانا والدورانتا والجاستشيا البيضاء والزرقاء . والفلاتش
رايكمبولانا . واللانثانا كمارا

ومن المتسلقات التامبرجيا جراندفلورا والشبرفايد والسولانم
وندلانداو الارجيريا والبجونيا فناستا والبوجانفليا (ماعدا النوع الاحمر
وكذلك تعمل الآن ترافيد بعض النباتات التي يصعب تكاثرها من
البذور والعقل كالفل المجوز والتكو ماسميرباي والماجنوليا والبوجانفليا
الحراء الطوبى ودم النزال

ويزرع ايضا القرنفل اما بالترقيد واما من عقل طرفيه

وفي فبراير تزرع الالبسطة الخضراء باللبيا وتجدد دوائر ورسومات
الشيخ والمطيره بازالة النباتات القديمة وعمل عقل منها وزراعتها من جديد
كل ٥-١٠ عقل مما في بؤرة واحدة . كذلك تفحص جذور الداليا والكننا
وتزرع في محلها الدام مباشرة

ويتنوع رى الورد من أواخر يناير لأواخر فبراير وبمجرد انتهائه من
التزهير يقلم ويسمد
وتزرع الآن عقل ورد النسر وهو نوع ردىء سريع النمو لتطعيمها
فيما بعد بالأنواع الطيبة
وفي هذا الأوان تقلم الأشجار وتسمد وكذلك يمكن نقلها وزراعتها
بنجاح ويجوز في أواخر فبراير زراعة عروة بدرية من الأزهار الصيفية
وسياتى الكلام عليها مفصلاً فى العدد القادم