

تقويم الحديقة

حديقة الفاكهة

مارس — ابريل

الغرس — يمكن نقل أشجار الموالح وغرسها في الجور المعدة لها ان لم تكن قد نقلت في الشهر الماضي ويمكن في هذه الحالة نقلها ملشا وقبل اجراء عملية النقل تجرد الشجرة من جميع أوراقها وتقليم أطرافها وتستأصل القرىعات الصغيرة

ويلاحظ دائما عند الغرس أن لا يدفن الطعم تحت سطح الارض خصوصا اذا كان نارنجيا

ولذلك يجدر بصاحب الحديقة أن يراعى عند شراء أشجاره أن يكون الطعم على ارتفاع مناسب على الاصل

المانجو — يمكن نقل أشجار المانجو في شهر مارس وريبلزم أن تنقل بصلاية كبيرة تحوى جميع جذورها ويلزم الاعتناء الزائد بصلاية الشجرة حتى لا تتفكك لأن ذلك مما يودى بحياتها. وبعد الغرس يمكن تغطية

النبات بزرية من حطب الذره حتى تتأصل جذورها في الارض وعند ذلك يرفع الغطاء تدريجا

ويجدر بنا أن نذكر هنا أن المنجو تجود في الارض الطينية الخفيفة الحسنة الصرف والحفاظة للرطوبة فكل محاولة لزراعتها في غير هذا النوع من التربة محكوم عليها بالفشل . وتزرع أشجار المنجو عادة على بعد قصبتين من بعضها وتزرع أشجار من الجوافة بين أشجار المنجو وتتأصل أشجار الجوافة عندما تبلغ المنجو من الحجم مالا يسمح ببقاء أشجار الجوافة بعد ذلك

النخيل — يمكن غرس فسائل النخيل في هذا الوقت وليلاحظ أن الفسائل كلما كانت كبيرة في الحجم كلما بكرت باعطاء محصولها ويلزم عند الغرس مراعاة النقاط الآتية

١ — أن تكون النقاط النامية تحت سطح الارض والا تعفنت من الرطوبة ومات النبات

٢ — اذا كانت الارض طينية ثقيلة يلزم وضع مقطع أو اثنين من الرمل في كل جورة ليساعد ذلك على سهوله نمو الجذور

٣ — في الاراضي الرملية يجب أن تعرس الفسائل بميل جهة الشمال حتى اذا هبت الريح لا تكون سببا في تقطيعها

٤ — يجب لف الاوراق والزر النامي بقطعة من الخيش أو الحصير أو خلافة كوقاية لمنع التبخير المتوالى من النبات قبل تأصله في التربة وتزال هذه الوقاية متى تأصل النبات

٥ — يجب أن تقلم جميع الاوراق الجافة قبل الغرس

ويجمل بنا أن نذكر أن أحسن وقت لزراعة الفسائل هو شهر اغسطس
حيث يكون الجو معتدلا والماء متوفرا أما الزراعة في شهر ابريل فشائعة في
الجهة الشمالية من الوجه البحرى كدمياط ورشيد حيث أن قرب البحر من
هذه الجهات من اكبر العوامل في تلطيف حرارة الجو عند دخول أشهر
الصيف على الفسائل المزروعة حديثا

ومن الامور الجديدة بالملاحظة أن أشجار النخيل تجوفى أنواع من
الارضى قلما تجود فيها أشجار أخرى من الفواكه فتجود فى الاراضى
الرملية والارضى الموجودة بها نسبة معينة من الاملاح ويزرع النخيل
على بعد قضبتين فى الغالب

الموز يعرف من الموز فى شهر مارس و ابريل ويلاحظ أن الفسائل
تكون كبيرة الحجم حتى يمكن الطول على محصول مبكر وأما المسافة
بين الاشجار فتكون قصبه

ومن الامور الهامة فى زراعة الموز أن يراعى أن لا تكون الارض
الجهزة لزارعته قد زرعت بمحاصيل الخضار قبل ذلك لمدة سنة أو سنتين
على الأقل وخصوصا ما كان منها من أنواع الكرنب والقرنبيط والبنجر
أو ما شاكل ذلك وهى التى تصاب عادة بالدودة الشعبانية (التماودا) ويحسن
فى هذه الحالة زراعة الارض ببذور الغلال حيث أن نباتاتها قلما تصاب
بهذه الدودة الفتاكة واذا عرفنا ذلك لانهش كثيرا من أن نرى أن الموز
المنزوع بمحاثق الاسكندرية لا يخلو من هذه الآفة حيث أن أصحاب
المحاثق كثيرا ما تزرع الموز بعد محاصيل الخضار
والموز من النبات التى تحتاج الى عناية كبيرة فلا يجوز الا فى الاراضى

الرملية أو الخفيفة ويحتاج الى ماء كثير وكمية وافرة من السماد البلدى القديم
وعقد الغرس يجب أن يلاحظ أن تكون النباتات خالية من الامراض
ويزرع الموز الهندى فى العراء وذلك لقصر سيقانه أما الموز البلدى فيزرع
فى الاماكن غير المعرضة للرياح الشديدة

الزراعة

تزرع بذور النارج والليمون البلدى والقشطة والباباظ فى شهر مارس
وابريل وتغطى أحواض البسرة بشرايح خشبية أو بحسريد النخل لوقاية
النباتات الصغيرة من حرارة الشمس الشديدة

وتزرع بذور التوت بعد أخذها من التمار مباشرة أو تحفظ فى الرمل
لتزرع فى أغسطس وتزرع البشملة بمجرد فصلها من ثمارها فى قصارى
نمرة ١٠

وكذلك يمكن زراعة بذور الجوافة فى مواجير أو فى صناديق أو فى
أحواض بالأرض كما تزرع بذور الطرابلس كذلك فى أحواض

تزرع عقلة البرقوق والليمون الحلو والتربج والتين والسفرجل فى
أوائل مارس ان لم تكن قد زرعت قبل ذلك أما عقلة العنب والمان فيجب
أن لا تتأخر لتزرع فى شهر مارس ويلاحظ أن يداوم فى رى أرض العقلة
بعد زرعها لضمان نجاحها

التزير

يبدأ تزير أشجار الموالح التى لم ينجح تطعيمها قبل الشتاء أو التى تركت
بدون تطعيم نظرا لصغر حجمها . والنباتات التى ينجح تطعيمها تقرط الى
ما فوق الزر بعشرة سنتيمترات

التسميد

يمكن تسميد الأشجار الكبيرة في مارس وأبريل بالاسمدة الازوتية والسماد البوتاسي اذا لم تكن قد سميت هذه الأشجار بالسماد البلدى أو سماد الاصطبلات في شهر يناير الماضى لعدم توفرها في ذلك الوقت وإنما يلاحظ هنا أن يكون بين التسميد بهذين السمادين فترة لا تقل عن ١٥ - ٢٥ يوما

وقد يعطى السماد الازوتى لحيطان البندرة أو لنبات المشتل لتشجيعها

على النمو

الرى

في هذا الوقت تكون أشجار الموالح مزهرة وبذلك يجب عدم ريهها حتى ينتهى تزهيرها وتبتدىء في عقد ثمارها ويجب أن تروى المنجو قبل التزهير وتراعى أشجار المشمش والخوخ بالرى بعد عقد ثمارها وكذا يروى البرقوق في أوائل مارس قبل التزهير ثم تروى بعد ذلك في أبريل بعد عقد الثمار ويراعى ريهها بعد ذلك وكذلك لا يروى العنب الا بعد عقد الثمار وتروى القشطة والجوافة في منتصف شهر مارس لأول مرة بعد الشتاء. ويمكن رى الكاكي واللاوطس في مارس قبل التزهير. كذلك يمكن رى التفاح والكمثرى في شهر مارس قبل التزهير

الآفات

تصاب أشجار الخوخ والمشمش والبرقوق والرمان بالندوة العسلية في شهر أبريل. وأحسن علاج لها أن ترش بمحلول السكتكلا وتصاب ثمار الرمان بدودة الرمان المسماة « فيرا كوليفنيا » ولوقاية

الثمار توضع في أكياس من الخوص حتى لا يضع فراش الدودة بيضه
على الثمار

ويصاب كذلك التفاح والسفرجل والرمان بحفار الساق ويجب اباده
هذه الحشرة بادخال سلك في الثقوب حتى يصل الى الدودة ليقتلها أو يضغط
في الثقب ثانياً كبريتور السكر بون

ويجب الاحتراس الشديد من عدم تبخير أشجار الموالح في شهر مارس
لان الأشجار في هذا الشهر تكون عليها أزهار فاذا أجريت هذه العملية
فلا بد من تساقط هذه الأزهار وبذلك يتلف المحصول