

## حديقة الخضر

في شهرى مايو ويونيه

(الهلبيون) : - يستمر جمع الهليون حتى أوائل يونيه اذا كان قد مضى سنتان على زراعته المستديمة أما اذا كان العهد بزراعته أكثر من ذلك فيستمر الجمع حتى شهر يوليه . ويلاحظ اتباع الارشادات السابق ذكرها في الاعداد السابقة في الاعتناء بجمع سوق النباتات القوية النمو وترك الرفيعة منها بدون جمع لتكون فرخا هوائيا بمد قرص النبات بالفناء فيقوى ويكبر في الحجم ويعطى محصولا أكبر وأعزر في الأعوام المقبلة

هنا واذا كان هنالك محاصيل مغلقة موقفة قد زرعت مع الهليون كالفاصوليا أو البصل (وهذا مما لا أشير على المزارعين باتباعه) فإنها تحصد في مايو وعقب حصادها تسمد خطوط الهليون بالسماد البلدى أو أزوتات الصودا لأنها تزيد في نمو النبات وقوته

ويلاحظ كذلك في حياض بذور الهليون المزروعة في الشهرين الماضيين أن تنظيف جيدا من الحشائش وأن تحف البوادر بحيث يترك بين الواحدة والأخرى قدر عشر سنتيمترات

أما نباتات الهليون التي نقلت الى الزراعة المستديمة في هذا العام فلا ينبغي أخذ محصول منها مطلقا

(الباذنجان والفلفل) : - تشتتل بوادر هذين الصنفين المزروعة بذرة في

الشهرين الماضيين . وهذه النباتات لا تثمر الا في شهر يونيه

ونظير في مايو ثمار العروس المزروعة بذرتها في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وهي

الزراعة البورية للباذنجان والفلفل العروس

هذا ويمكن في هذا الوقت زراعة بذور الفلفل البلدى والباذنجان الأسود اذا

أريد نقل بوادرهما في الخريف وتعقيرهما في الشتاء المقبل

ومن المستحسن دائما التبركير في شتل الباذنجان الطلياني والفلفل الرومي في الشهرين الماضيين حتى يمكن الحصول منها على ثمار قبل حلول فصل الشتاء . لأنه ليس ثمة فائدة من تعقيرهما لأن ذلك يؤدي الى صغر حجم أثمارهما وامتلائهما بالبذور الكثيره فضلا عن اكتسابهما طعما مرا غير مقبول وكل ذلك ينافي الغرض الذي زرعنا من أجله في الحشو والسلطة وفي شهر مايو والشهر الذي سبقه تظهر ثمار الباذنجان والفلفل العقر وتباع بأثمان مرتفعة

ملحوظة : — عند ما تبدأ نباتات الباذنجان والفلفل في الأثمار يراعى أن تعطى كفايتها من الماء مع تكرار العزيق واستئصال الحشائش وأخصها بالذكر الملوكة ويلاحظ كذلك جمع الثمار متوسطة الحجم بأن لا تكون متناهية في الصغر ذات طعم مر ولا أن تكون كبيرة تسبب تعجيزا للنباتات وتعطيلاً لأثمارها

الكرب والقنبيط : — تزرع بذورهما الآن في حياض جيدة التسميد ويلاحظ الاعتناء بريها وعدم الاكثار من ذلك حتى لايزداد نموها بحالة تعجمها غير صالحة معها للشتل فيما بعد ويرى من ذلك أن في تقليل الماء عنها فائدة لها اذ يشتد نموها ويسرع نبتها متى زرعت في مكانها الدائم ويلاحظ مثل ذلك في البذور المزروعة في الشهر الماضي ويكفي الفدان الواحد لزراعته من نصف الى ثلاثة أرباع كيلو جرام بندرة

كرب بطة والمخرفش والاحمر : — يشرع في شتل بوادرها ابتداء من الآن في خطوط عدتها من ٥ الى ٦ في القصبه الواحدة

كرب ابي ركب و بروكسل : — يمكن زراعة عروة من بذور ابي ركب و كرب بروكسل أو شتلها . فتنقل بوادر ابي ركب على جانبي متون عددها ستة في القصبه بين النبات والآخر ٢٠ سنتيمترا . أما كرب بروكسل فتزرع بوادره على جانب واحد من المتن على بعد ٤٠ الى ٥٠ سنتيمترا من بعضها في متون عددها خمسة في القصبه

الفاصوليا : — يمكن الاستمرار في زراعة الفاصوليا اذا أريد ذلك

الملوخية : — يستمر زراعتها في هذين الشهرين في حياض اغثنى تجهيزها وتسميدها ويلاحظ في الملوخية المزروعة في هذا الوقت أن لا يؤخذ منها أكثر من حشتين أو ثلاث وبعدها يحسن تجديده الزراعة حتى بذلك يتسنى للزارع الحصول على نباتات غضة الاوراق نضرة الاخضرار هذا ومتى بلغت النباتات نموا ملائما ترش بأزوات الصودا أو بالسما الكفري لزيادة نضرتها وخضرتها

الرجله : — زراعتها كالملوخية ويحسن تجديده الزراعة بدلا من أخذ عدة

حشات منها

السبانخ : يزرع منها الآن النوع الهندي والنيوزيلاندى والفير فلای والجبلی في حياض جيدة التسميد أما النوع البلدى فيستحسن عدم زراعته الآن لميل نباتاته الى تكوين زهور فينبور

والحصول على سبانخ باستمرار تكرر زراعته في كل شهر . ويمكن أيضا زراعة السبانخ كحصول مؤقت بين نباتات الطماطم

البطاطه : يستمر في زراعة البطاطة ويستحسن أن يكون الغرس مبكرا ما أمكن

الطماطم : تطهر في مايو ثمار الطماطم المزروعة في يناير وفبراير وتباع بأعلى الأثمان . ونظرا لاشتداد الحر في هذا الوقت يحسن تعطية النباتات بحطب الذرة لدرء الحرارة عنها كذلك يمكن الآن زراعة بنور الطماطم في حياض جيدة التسميد لشتها بعد ٤٠ - ٥٠ يوما في مكانها المستديم

الكوسة : يستمر في زراعة الكوسة بنوعها الاسكندراني والبلدى

والكوسة أحد الزروع التي لا تحتاج الى ماء كثير قبل دور الامتار وأشد آفة تصيبها هي مرض البياض فيعيق نمو النبات ويضعفه والطريقة المثلى للدرءة هي تعفير الاوراق بالكبريت بين آونة وأخرى للوقاية . ويلزم الفدان الواحد من ٣٠ - ٤٠ كيلو جراما من الكبريت ويلاحظ لاتمام هذه العملية أن تزال الحشائش التي توجد

في الارض كلسان الحمل وغيرها لانها كثيرا ماتصاب بالبياض وتكون واسطة في نقل المرض الى الكوسة

البطيخ : تنتهى في مايو زراعة البطيخ في غير أرض الجزائر . ويظهر في مايو البطيخ البدرى المزروع في شهر نوفمبر الماضى ويباع في هذا الوقت بأعلى الاثمان أما نباتات البطيخ المزروعة في الشهرين الماضيين فيلاحظ رشها بمسحوق الكبريت اتقاء مرض البياض ويلاحظ كذلك خف النباتات التي كبرت وظهرت بها الثمار حتى بذلك ينفصح لها المجال لتحمل ثمارا كبيرة وتنمو نمو مطردا ومما يجدر الاشارة اليه ملاحظة الاعتناء برى البطيخ المسقاوى ربا بأعتدال فان كثرة العطش الذي يعقبه الرى الكثير يؤدى الى عدم انتظام نمو الثمار وتشتتها وفسادها

السنطاوى : تنتهى زراعته في مايو وأحسنه ما زرع بمواجز الجبال والارض الرملية وأشهر الجهات لزراعته في ضواحي القاهرة في كفر الجواموس والخانكة ويحتاج هذا المحصول لرى كثير متى كانت تربة الارض خفيفة رملية وتجبر أرضه للزراعة بتقسيمها الى مصاطب كل ثلاثة منها في القصبه ويجعل بعد النباتات عن بعضها ٧٠ سنتمترا

اللوبياء : يمكن زراعتها هذين الشهرين ونمو العروة في هذا الوقت أسرع من المزروعة في مارس وموعد حصادها متقاربان تقريبا

ويستحسن دائما نظرا لتعرض نباتات اللوبياء للاصابة بمرض الصدأ أن تنتخب الاصناف المنيعه ضد الصدأ كالنوع الذى استحدثته قسم البساتين بوزارة الزراعة

الكرفس : يجب الاعتناء بنظافة الحياض المزروعة بها بنور الكرفس حتى تنمو البوادر نمو حسنا يجعلها أهلا للشتل في شهر يولييه

وقد وجد بالتجارب في قسم البساتين أنه لو نقلت وادر الكرفس من حياضها الان في متون بحيث تجعل في جانبي المتن على بعد ١٠-١٥ سنتمترا بين البادرة الاخرى

ثم يعاد شتلها لمحلها الدائم في يولييه لسكان نموها أقوى مما لو شتلت دفعة واحدة  
الفلقاس : تتم زراعة الفلقاس في مايو في الاحوال المتأخرة اذ أن بعض الزراعين  
يزرعونه بعد حصاد الشعير والفول

ويلاحظ الاعتناء بتجهيز الارض وتسميدها الى غير ذلك مما سبق ذكره في  
الاعداد الفائتة ويستحسن عدم زراعة محاصيل مؤقتة مع الفلقاس وان كان قد  
زرع شي منها في الزراعة البدرية فانها تحصد في مايو كالملوخية والفجل والخيار  
كما يفعل زراعو المنوفية

أما في الزراعة البدرية للفلقاس التي تمت في الشهرين الماضيين فيلاحظ فيها الآن  
العزيق المتوالى ولف النباتات بعد كل عزقة بطبقة من الترى حتى تصبح في آخر  
عزقة في وسط المتن . ويلاحظ كذلك الاعتناء برى الفلقاس . ولا ينبغي الاكثار  
من الري الآن الا متى خرجت جميع العيون وقوى النبات فتقصر فترة الري اذذاك  
البطاطس : يوافق الان حصاد البطاطس الصيفية المزروعة في أواخر يناير

ويعرف أوان الحصاد عند ما يجف أوراق البطاطس كلها وتستخرج درنات البطاطس  
بالفأس ويلاحظ الاعتناء في استخراجها بعدم تجريحها ثم يفرز السليم منها من المعطوب  
الفجل : - يمكن زراعة الفجل البلدى والرومى الأحمر في مكان مظلل رطب

وتزرع البذور نثرا في صفوف تبعد عن بعضها من ١٥ الى ٢٠ سنتيمترا في حياض  
صغيرة وتروى الارض عقب الزراعة وتخف النباتات متى كبرت

الشوليك : - تكثر ثماره في هذين الشهرين وتباع بثمان منخفضة وتستمر  
النباتات في الأثمار حتى شهر يولييه ويلاحظ دائما -والالة نباتاته بالري لان تعطيش  
النباتات يضر بها

الخس : - يزرع الآن منه الرومين والتوجه فقط وتلزم زراعة البذور في  
مكانها الدائم بدون شتل في محل مظلل