

حديقة الخضر

في

شهرى يوليو وأغسطس

يوافق في هذين الشهرين زراعة كثير من الخضر السيفة لاسيما المهم منها كالكرنب والقرنبيط والكرفس الخ وتزرع هذه الخضر بمساحات وسيعة في أرجاء القطر :

الهلبيون : - يستمر في جميع الهليون حتى آخر شهر يولييه في الزراعة المستديمة التي مضى عليها اكثر من عامين وبعد ذلك يوقف الجمع وتترك جميع السوق الارضية لتسكون فرخا هو ايثيا يحمل أوراقه وأزهازه

الباذنجان والفلفل : - يمكن زراعة البزور في يولييه ليمتنى شتلها في أواخر اغسطس وأوائل سبتمبر وهذه المررة هي التي تستمر نباتاتها في الشتاء ليؤخذ منها المحصول العقر في الربيع القادم. وتجدر الاشارة الى أن الثمار الناتجة في الخريف من هذه المررة تنفق كثيرا في جودتها ونضارتها الثمار الناتجة من نباتات الربيع التي تكون قد انهكها الحر والحق بها ضررا يذكر

الخرشوف : - يبدأ بزراعته في شهر أغسطس ويلاحظ لدى تجبيره الارض للزراعة ان تستمد جيدا بخليط من السماد البلدى والكمبواى لانه ثبت من التجارب أن ذلك يساعد في تبكير نضج الرؤوس فضلا عن زيادة عددها ويلاحظ وقت الزراعة أن تجزأ النباتات القديمة الى أجزاء كبيرة وان تغرس في المتون أثناء غمرها بالماء بحيث تكون الاجزاء الحاملة للبراعم جهة المتن والاجزاء المجروحة الى الخارج ثم يعادرى الارض بعد اسبوع

ريا خفيها خوفا من تعفن النباتات ثم تروى الارض وقت الحاجة متى بدأ
النبات في النمو

الفردون : - يشتل الآن من البذر المزروعة في ابريل ومايو وزراعته
كالخرفشوف عاما

الكرفس بموعيه . - تشتل الآن بوادره المزروعة ببزرة في ينساير
وفبراير في متون عدتها خمسة في القصبية ويزع النوع الابيض (بسكال)
على جانب واحد من المتن والبلدى على جانبيه

كرات ابو شوشه : - تغرس الشتلة خلال هذين الشهرين في متون
كل خمسة منها في القصبية على الجانبين وهذه الشتلة ناتجة من البذرة
المزروعة في يناير وفبراير

السكراب والقرنبيط : - تشتل بوادرهما المزروعة ببذرة في ابريل ومايو
في هذين الشهرين ويمكن كذلك زراعة عروة جديدة من بذورهما الان
وهذه العروة تشتل فيما بعد لتكون المحصول المتأخر . وتجهز الارض الى
متون كل أربعة في القصبية وبعد النباتات عن بعضها لا يقل عن تسعين
سانتيمترا .

كرب بروكسل وبطه وأبو ركبہ الخ : تشتل نباتاتها الآن ويحسن
التبكير في الشتل ما أمكن خوفا من اصابتها بحشرة المن في أواخر الصيف
ويمكن أيضا تجديد زراعة عروايت من أبو ركبہ

اللوبياء والفاصولياء : يمكن الاستمرار في زراعتها وبالاخص اذا
أريد أخذ بذور جافة منها لان هذا الوقت أوفق لهذا الغرض

الخيار : - تزرع في هذين الشهرين عروة الخيار النيلى بطريقتيه

المعروفتين .

الخس . - يبدأ بزراعة جميع أنواعه في أواخر أغسطس فإيليه لتكون
معدة للشتل بعدئذ . أما خس لا توجه فيمكن نثر بذوره في شهر يولييه دون
شتلها . ويلاحظ في هذا الوقت اجراء الزراعة في مكان ظليل خوفا من
شدة القىظ .

الكوسة . - يستمر في زراعة نوعيها الاسكندراني والبلدى

الشوليك . يبدأ بزراعته في أواخر أغسطس وينبغي الاعتناء التام

بتجهيز الارض جيدا بالسماد البلدى القديم وتقسيماها الى متون عدتها
خمسة في القصبية وتجزأ النباتات القديمة الى اجزاء كبيرة مناسبة وتغرس
على جانبي المتن على بعد ١٥ - ٢٠ سنتيمترا من بعضها ويلاحظ موالاة ري
الارض حتى يبدأ النمو في النباتات وبعد ذلك توى حسب الحاجة

القاوون والبطيخ . يزرع الآن النوع النيلى منهما المعروف بالدميري

البطاطه . تنتهى بانتسها هذين الشهرين زراعة البطاطة ولا يجوز

التأخير الى ما بعد ذلك خوفا من تأذى المحصول بالبرد

الباميا . يستمر في زراعتها والثمار الناتجة من هذه العروة تكون احسن

بكتير من الثمار الناتجة من زراعة الربيع لان هذه الاخيرة تتأثر كثير من

الحر . والعروة المزرعة في هذا الوقت يمكن تعقيرها في الشتاء لاختد

محصول مبكر منها في الربيع القادم

البسلة : يبكر بزراعتها في أواخر أغسطس لاسمبالانواع القصيرة منها

البطاطس . يشرع في زراعة المحصول المعروف بالشتوى في أواخر
أغسطس وفي سبتمبر ويستحسن التبكير ما أمكن خوفاً من تأذى
الدرنات بالصقيع
الطماطم . تشتل في هذا الوقت نباتاتها المزروعة بذرة في الشهرين
المتصرمين وهذه الزراعة تعرف بزراعة « الخريف » وتثمر نباتاتها في
نوفمبر وديسمبر

البصل . تزرع بذوره في أغسطس لتشتل في أواخر يناير إذا أريد
الحصول على البصل الأخضر فنزرع البصلات المعروفة بالزور وهي التي
تكون قد عجزت من محصول السنة الماضية وكذلك يمكن زراعة البصل
المقور للحصول على البصل الأخضر في أوائل فصل الشتاء
محاصيل ثانوية . يوافق في هذين الشهرين موعد زراعة بذور اللفت
والسبانخ والفجل والبقدونس والجرجير والسلق كما تزرع في آخر أغسطس
بذور البنجر والجزر لاخذ عروة بدوية منهما

