

تقويم الحديقة

حديقته الخضر

سبتمبر وأكتوبر

الخرشوف . يمكن في النصف الاول من شهر سبتمبر زراعة
الخرشوف اذا لم يكن قد تم في ذلك الشهر الماضى ، هذا مع العلم أنه كلما
بكر في زراعته كلما جاء المحصول مبكرا . ولا يخفى أهمية ذلك . ومما
نلفت اليه الانظار في هذا الصدد أيضا المدول عما ألفه بعض المزارعين
من تجزئ النباتات القديمة الى قطع صغيرة ، فان نسبة كبيرة من الاجزاء
الصغيرة لا تنبت أو يكون نبتها ضعيفا ، ويترتب على ذلك نقص المحصول
علاوة على التأخير في إعطاء الرؤوس .

البسلة تزرع عروة بدرية من البسلة في شهر سبتمبر ، وعروة أخرى
في شهر أكتوبر ، وتزرع الانواع الطويلة في الجهة البحرية من مصاطب
عرضها مائة وعشرين سنتمرا ، أما الانواع القصيرة فنزرع على متون
بمدها عن بعضها ثمانية سنتمرا . وفي كلتا الحالتين يكون البمد بين الجورة
والاخرى نحو الخمسة وعشرين سنتمرا . وقد يكون من المناسب (خوفا
من تعفن البذرة اذا تلاصقت ببعضها الخمسة أو الستة في جورة واحدة)
أن تزرع البذرة منفردة تبعد الواحدة عن الأخرى نحو الثلاثة سنتمترات
في الجهة البحرية للمتون أو المصاطب في الجزء العلوى منها وذلك بمدرى
الارض وجفافها قليلا بحيث تصلح لانبات البذرة وتخف النباتات في هذه

الحالة اذا وجدت ضرورة لذلك وبما أنه وجد أن محصول البسلة القصيرة يساوى في رزقه محصول الطويلة وأن القصيرة أسرع ازهارا وأثمارا فيحسن والحالة هذه أن يستغنى بها عن الطويلة وذلك لما تتكلفه الأخيرة ثمنا لا حطاب تتساق عليها وأجرة غرس هذه الدعامات

الفول الرومى: تزرع عروة مبكرة من الفول الرومى أثناء شهر سبتمبر وعروة أخوى في شهر أكتوبر. والاصناف المعروفة بمصر نوعان: الفول الرومى الابيض والفول الرومى الاسود، ووجد نوع ثالث قرونه طويلة اسمه الاجوادلش الا ان محصوله قليل بالنسبة للنوعين الآخرين. وقد وجد أن الفول الرومى الاسود يعطى محصولا أكبر من الابيض وبنائاته أكثر تفرعا، لهذا فانه يحتاج الى مسافه أوسع عند الزراعة، فيزرع الفول الاسود في جور البعد بين الواحدة والاخرى ثمانون سنتمترا ولا يبيض على بعد ستين سنتمترا بين الجورتين ويجب تهديد تربة الحياض وجعلها مستوية ويوضع في الجورة بذرتان أو ثلاثه متباعده عن بعضها حتى اذا انفقت لا يمتد ذلك الى المتلاصقة بها، وتزرع البذور بعد رى الأرض وجفافها جفافا مناسبيا. ويزرع بعضهم محصولا مؤقتا من السبانخ أو الفجل بين صفوف الفول. وفي هذه الحالة يزرع الفول في الجور كما قدمنا ثم تبذر السبانخ أو الفجل نثرا وتغطى بقليل من التراب ثم يروى الجميع دفعة واحدة الشليك أو الفراوله. قد لوحظ أن زراعة الشليك في شهر أغسطس يصيبها بعض الضرر من ارتفاع درجة الحرارة في هذا الشهر مما يتسبب منه موت كثير من النباتات المنزعة. فقد شوهد غيط شليك بالجزيرة وقد ماتت فيه أكثر النباتات المنزعة قبلى المتون ولم يصب النباتات

المنزرعة في الجهة البحرية من المتون أذى . وقد أراد المزارع مقاومة تأثير الحرارة الشديدة بزيادة الري فأدى ذلك الى نمو خضروى عظيم للنباتات التي لم تمت ، ولكن المحصول رغم ذلك كان أقل من محصول زراعته شهر سبتمبر بكثير لان الاخير سلم من تأثير الحرارة الشديدة ونجحت أكثر نباتاته .

لذلك نرى من الأوفى زراعته الشليك في النصف الاول من شهر سبتمبر في تلك المناطق

الكرنب . يزرع في شهر سبتمبر أو أوائل أكتوبر آخر عروة من الكرنب الذي زرعت بذرته في الشهور السابقة

القرنبيط . يزرع في سبتمبر العروة المتوسطة المسماة بالطوبى ويزرع في أكتوبر شتلة القرنبيط الوحى أو الامشيرة

الكرنب أو البطه . تزرع البذرة وتشتل في أى وقت خلال هذين الشهرين

الفاصوليا . تزرع الفاصوليا في شهر سبتمبر لتؤكل قرونها خضراء ، ولكن لا تترك للحصول على البذور الجافة فان الطقس البارد يحل قبل تمام نضج القرون ، ويمكن زراعته عروة متأخرة في أكتوبر مع البسلة فزرع الاخرة على الجانب البحرى من المصطبة التي عرضها متر وعشرين سنتمترا (بسلة طويلة) وتزرع الفاصوليا على الجانب القبلى من المصطبة

البطاطس : يزرع في سبتمبر البطاطس الشتوى الذى يعطى محصوله في شهر ديسمبر قبل دخول الصقيع . وفي شواطىء البحر الأبيض - جهة الاسكندرية - فديزرع البطاطس في شهر أكتوبر أيضا

الكرفس . تزرع بذرة الكرفس في سبتمبر و اكتوبر للحصول على نباتات تستعمل أوراقها في الحساء (الشوربه) ويمكن نقل الشتلة الكبيرة في سبتمبر الى متون سبق تسميد تربتها جدا بسماد الاسطبلات المتعفن الكرات أبو شوشه . يمكن نقل الشتله في شهر سبتمبر على جانبي المتون التي بعدها عن بعضها ستون سنتمرا

البصل . تزرع بذرته في شهر سبتمبر لنقل الشتله في شهرى ديسمبر ويناير وكذلك يمكن زراعة البصيلات الصغيرة في سبتمبر للحصول على البصل الاخصر

السبانخ تزرع أول عروة من السبانخ البسلى في شهر سبتمبر وتستمر زراعته أثناء شهر اكتوبر

البنجر . تزرع العروة الاولى في شهر سبتمبر وتستمر الزراعة في شهر اكتوبر ، وهو إما ان يبقى في الحياض التي زرعت بها البذور أو تنقل الشتلة لزراعتها على متون وذلك للحصول على رؤوس كبيرة

الجزر الافرنجى . تزرع البذرة في أى وقت أثناء هذين الشهرين . اما نثرا في حياض أو في خطوط تبعد عن بعضها بقدر ١٥ سنتمرا . والجزر من الحاصلات التي تجود بكثرة التسميد واتفاق الخدمة

الشكروبا والهندباء . تزرع بذرتهما في هذين الشهرين ، وتنقل الشتلة عندما تبلغ حجما مناسبيا الى متون تزرع على جانبيها

الחס . تزرع بذرته في شهرى سبتمبر و اكتوبر وتنقل الشتلة بعد زراعة البذرة بنحو شهر

الفنوكيا . تزرع البذرة أثناء هذين الشهرين وتنقل الشتلة متى بلغت

الحجيم المناسب لتزرع على جانب واحد من المتن

السلق : تزرع البندرة في حياض نثرا باليد أثناء هذين الشهرين
الطماطم . تنقل الى مصاطب في أكتوبر لتعطي محصولا في الربيع
الجزر الابيض والسلسفيل . تزرع البندرة في سبتمبر وأكتوبر ،
ويجب عدم التأخير في ذلك حتى تمضج الجذور قبل اشتداد الحرارة
الخبازى والكذبرة والشبت . تزرع بذور هذه الأنواع في سبتمبر
وأكتوبر في حتوياض نثرا باليد

المقدونس . تزرع بذره في أى وقت أثناء هذين الشهرين
الجرجير والفجل والخردو . يمكن زراعتها في أى وقت
اللفت الأبيض . تزرع عروة كل شهر

