

تقاوي الخضر

يشهد الحر ويسرع نمو النباتات والخشاش ويتحمّل الالتفات لثلاث الاختيارات قبل قيام وقوع ضررها على المحاصيل وهذه تؤدي بالري الشكثي طول تلك الفترة وبسبب استمرار الفيضان ينطر طب الجو نوعاً من اوآخر اغسطس ويزداد العمل في حديقة الخضروات لاعداد الارض زراعة المحاصيل الشتوية بدرياً كالشليك والخرشوف والبسلة والجزر والمنجر والسبانخ وغيرها أو زراعة عروة اخيرة من السكرن والباذنجان

المشتل — تبذّر تقاوي الطاطم لتنقل شتلاتها في سبتمبر واكتوبر لعمل عروات شقوية وخلال اغسطس يبذّر ابو ركبة والسكرن الافرنكي الاملس والخروفش وحوالى اواخره يبذّر البصل والخس . وفي تلك الفترة تكون شتلات الباذنجان والقلفل والسكرن والقرنبيط معدة للنقل

الشتل : — السكرن البلدي والقرنبيط . تنقل شتلاتها في أي وقت خلال يوليه واغسطس وفي هذا الوقت تكون الشتلة (زراء، ابريل ومايو) بالغة اشدتها وانما يحسن انتخاب القصيرة منها واتخالية من اصابة حفار ساق السكرن

الباذنجان — تنقل شتلاته الى الخطوط خلال تلك الفترة لعمل عروة نيلية تنمو ثمرةً غصاً خلال نوفمبر وديسمبر ويمكن ابقاءها عقرأً للعام التالي حيث تنمو بدرياً في ابريل وفي الجهات القبلية كديرية المنيا يستمر جمع تلك العروة حتى منتصف فبراير حيث تباع شمن مرتفع جداً أما عروة مارس فتصبح بحلول شهر اغسطس منهوكة القوى وتكون ثمارها اكثراً بذوراً ومرارة

الكرفس — تصلح شتلاته للنقل الان وتحاطط الارض بمعدل خمسة في القصبة ويفرس الكرفس على جانب واحد من الخط بعد ٣٠ س.م بين الشتلات والبلدى على جانبي الخطوط (دجل غراب) على أن يزال جانب منه بدرياً وهو صغير ويبقى الجانب الآخر حتى يبلغ اقصى حجمه

الكرات تنقل شتلاته في يوليه او اغسطس على خطوط كل خمسة في قصبة

الطاطم — ينتهي أعمار العروة الشتوية وتنقل الشتلات أحياناً في يوليه لعمل عروة نيلية شتاءً في يناير وفبراير أما العروة الصيفية المقوله في مارس فيعاد تسميدها وعزرها في أغسطس لستمر في الأئمار حتى نوفمبر وديسمبر الخرشوف — بعد خدمة الأرض بالحراثة المعاقبة مراراً وتسميدها جيداً بساد عضوي تخطط بمعدل أربعة في القصبة وبعدها يؤتى بجذور الخرشوف وتفصيص إلى أجزاء مناسبة مع ملاحظة عدم الاكتثار من الجروح وتغرس تلك الأجزاء في جوانب الخطوط على بعد ٩٠ س.م من بعضها على الأقل وبعد الانتهاء من الزراعة يحسن قربة بعض الأزدار السليمة في موقد مناسب أو في قصار كل ذر على حدة لاستعمالها في الترقيع فيما بعد ويجري الترقيع بعد شهر أو شهرين من تاريخ زراعة الشليك — يجهز الأرض بالخدمة والسماد القديم خلال يوليه لتغرس بشتلاته عند أواخر أغسطس . وتفصيص النباتات القديمة إلى شتلات تغرس على بعد ١٥ س.م من بعضها وعلى جانبي الخطوط الزراعة :

الباميا — تزرع عروة منها في يوليه وتكون نباتاتها عرضة للإصابة في سبتمبر وأكتوبر بدودني لوز وبذور القطن وكذا بق شعر القطن السکوسة — تزرع منها عروة تان ولا ضرورة لنقع البذور في هذا الوقت الفاصوليا — تزرع عروة من اليسمين في يوليه للانتفاع بثروتها خضراء وعروة أخرى في أواخر أغسطس لأخذ بذور حاجة منها المقات — يزرع الخيار والشمام والقاونون خلال أغسطس بنجاح تام ويراعي التعفير مرتين أو ثلاثة بمسحوق كبريت العمود ضد الحشرة المحرواء وعدا ما تقدم يمكن التبكيت بزراعته السبانخ والجزر والفت والخس والبنجر من النصف الأخير من أغسطس

محمد بيومي علي