

## فواكه المنطقة الحارة

بقية معلومات المسيو الفريدي بسرير بالصف

(١٤) — سيريس جاماكارو (Cereus Jamacaru) فمار حمراء ناصعة تتفجر عند تمام نضجها ولبها غير متراكمة حول المذاق محتو على بذور صغيرة سوداء اللون ونباتها يبلغ طوله امتار طولاً وازهارها كبيرة بيضاء تفتح في المساء وتذبل عند وقوع أشعة الشمس عليها في الصباح

(١٥) — الليمون الهندي (Citrus decumana) قد عرض صنفان هن الليمون الهندي الكبير والصغير الاول يستعمل في المرطبات والمسكرات والثاني كفا كثة افطار في الصباح باعربيكا وينتظر اقبال الاوروبيين عليه كالامر يكفين

(١٦) — السفرجل العطري (Cydonia sinensis) فمار كبيرة الحجم ذات قشرة ناعمة ولب أصفر من مشيله في السفرجل العادي ويصلح في عمل الحلوي وموطنها بلاد الصين

(١٧) — شجرة العطاطم (Cyphomandra betacea) فمار مطاولة بيضوية الشكل صفراء اللون لها طعم طباطبي ضعيف وشجرتها صغيرة او راقبها ذات رائحة رديئة وتحمل عناقيد المثار بالقرب من اطراف الفروع

(١٨) — السابوتا السوداء (Diospyros ebenaster) فمار توكل وهي قابلة لزيادة اسیولة الدم ومفيدة للحمضنة

(١٩) — السكاكى (Diospyros kaki) العينة المعروضة كانت في غير اوانها ولذا تراها ذابلة لا يصلح للأكل وقد صار السكاكى فاكهة معروفة بمصر الان والفضل في ادخالها يرجع للمداشاوي باشا

(٢٠) — فماخ الخشب او الفيل (Feronia elephantum) ادخلها لمصر ابراهيم باشا وهي فمار كروية الشكل في حجم التفاحه الكبيرة ذات غلاف صلب رائحتها شديدة عند النضج لها اشكال ناعم حمضي نوعاً مدفونة فيه البذور تشبه سفرجل الهند وتوكل المثرة في الهند بالسكر وستعمل في المرطبات والشجرة من خانة البرتقالي وهي شائكة متتساقطة الاوراق ويمكن تطعيم انواعها عليها وهي تتکاثر من البذور وهناك تجارب تجري لهذا الغرض في كاليفورنيا وفلوريدا بمعونة مصلحة

## الزراعة بالولايات المتحدة

(٢١) برقوق مدغشقر (Flocourtia Rammotchi) فمار شبيه بالكراز بعض الشبه في اللون اي حمراء داكنة ذات لب اخضر يشبه البرقوق في الطعم يضغط باليد حتى يلين اذا أريدا كله ويستعمل لصناعة المربى والفطائر ويحتوي على بذور قليلة نافحة منقطة وشجرتها كثيفة الفروع قليلة الشوك وتتكاثر من البذور

(٢٢) عرض من أصناف التين الهندي صنفان tuna & Paraguayens D. فمار الاوتياتونا طوبيلة صغيرة الحجم طالب كثيرة العصارة تستعمل في تلوين المشروبات والفطائر وكلا الصنفين يصلحان لعمل الاسبريج

(٢٤) - الجوافة Pilsidium guava تزرع انواع كثيرة من الجوافة في مصر ولكن اكثراها انتشارا هي الجوافة العادي وهي احسن انواعها لكبر لبها وحلاؤه طعمها والثار التي عرضت في غير اوانها (رجوع)

(٢٥) - بيجون سولاندري Spoudias plaiogyna (Burdekin plum) or Pleiogynium Solandri فمار كبيرة سوداء تفرياً بحجم البرقوق الكبير تحمل على عيadan طوبيلة وهذه المار لا تطرى ولذا تستعمل مطبوخة فقط وطعمها اذ ذاك يكون كالبرقوق الجفف وهي فاكهة ذات اهمية تأوية الا انها تتضخم في فصل تقل فيه الفاكهة وشجرتها ترتفع بسرعة وتتحمل فمارها في السنة السادسة من غرسها اذ هارها يقضاء مخضرة محولة على عناقيد

(٢٦) - الحلوى او المست المستحبة (فيسبالس بيروفيانا Physalis Peruviana) فمار صغيرة صفراء اللون في حجم البندق الصغير مقنطة بكأس جاف ورقي مستديم طعمها مقبول وتوكل كفاية طازة أو تحفظ أو تعمال مربة ونباتها عشبي قصير زاحف ويتكون من البذور وهو حولي

(٢٧) - سبوندياس بيرو Spondias Birroea فمار في حجم الجوز توكل بذورها ومن طالب يحضر مرار متاخر

(٢٨) سبوندياس دواس (Spondias dulcis) فمار صفراء كهرمانية في حجم الليمونة تتضخم بعد سقوط الاوراق في الشتاء وقبل التضخم لها رائحة راتينجية

وتؤكل مطبوخة ويكون لها طعم التفاح حينذاك وحول نواتها الكبيرة الياف تتملّق  
قيمتها ولها قليل حمض تستعمل في المربات وشجرتها متتساقطة الاوراق ازهارها  
صغيرة ضاربة الى الصفرة محولة في عناقيد مركبة التفرع وتشكل من البروز

(٢٩) — سبوياس مانجفرا (*Spondias mangifera*) فُرة لونها اصفر  
ذي قوسي مشووب بلون اصفر واسود رائحتها ضunguineة جداً وليس فيها رائحة السفرجل  
الموجودة بالأنواع الأخرى والجزء الداخلي القريب من القشرة حمضى نوعاً وعلى  
الثمرة غير مقبولة وعند كبر حجمها تصير كبيضة الوز وأحياناً تؤكل  
تحضراً وكثيراً ما توضع بالهند في السمك أو العدس لاعطاها الطعم الحمضي

(٣٠) — استريكنوس اسبينوزا (*Strychnos spinosa*) نمار في حجم  
البرتقال ولو نه لها كثيراً يُؤكل والبروز كثيرة قشرتها صلبة

(٣١) — التمر الهندي (*Tamarindus indica*) أو العرديب باقة اهل  
السودان والتمر بلغة العرب لبه الحيط بالبروز مجرد ملطف مسهل خافض للحرارة  
يحمله العرب دواماً لانتقاء المطاش اذا اشتد الحر ويظهر ان العرب عرفوه عن  
طريق الهندوس ومن كتابات العرب عرفته اوروبا بذلك في القرون الوسطى  
ويحضر من البذر زيت عديم الرائحة حلو المذاق وفضلاً عن منافع الثمرة  
فإن الأشجار من أحسن اشجار الزينة في المناطق الحارة

(٣٢) — فانجورا انفاستا (*Vangueria infansta*) فُرة في حجم التفاحة  
الصغرى تؤكل طازة وقبها بذور ولكنها غير لذيذة مساء مستدركة صفراء تصرّف  
عند الفضي وشجرتها صغيرة متتساقطة الاوراق موطنها مدغشقر

وقد عرض اربعة جذور درنية بعض نباتات نشووية وهي :

(٣٣) كانا اديولس (*Canna edulis*) الاراروت الكوينزلاندي

(Dioscorea alata & D. bulbifera) (٣٤) ديو سكوريا (Dioscorea alata & D. bulbifera) (٣٥)  
المعروف في التجارة باسم يام Iams

(Manihot utilissima) (٣٦) اتايوكا او الاراروت البرازيلي

(Maranta arundinacea) (٣٧) الاراروت