

تقويم الأزهار

يمكن توجيه العناية بحدائق الزهور ابان هذا الفصل من حيث الخدمة العامة بها فتقطف الزهور الذابلة مع مراعاة الري وعزق الحديقة كلما احتاجت لذلك وتنظيفها مما يتساقط من الاوراق وما يمتو من الحشائش وما يجف من الفصون •

وتزرع عقل القرنفل المأخوذة من أفرع قوية في مواجير وتفرد فيما بعد في قصارى نمرة ١٠

وأنسب الاوقات لزراعة عقل ورد النسر هو في يناير فتتخب عقل الافرع القوية ويكون طولها ٢٠ سنتيمترا وتزرع في متون تبعد عن بعضها ٥٠ سنتيمترا وبين العقلة والاخرى ٣٠ سنتيمترا •

ويمكن زراعة عروة من عقل الأراولة في أواخر يناير واخرى طول فبراير كل ٣ أو ٤ عقل في قصرية ثم توضع في مكان دافئ من الحديقة مع ملاحظة أن لا يزيد طول العقلة عن ٥ سنتيمترات وتفرد النباتات عند بلوغها حجما بقصارى نمرة ١٥ مع خلط تربتها بسماد الاسطبلات المتخمر بنسبة النصف لكل منها •

ومن الابصال التي يمكن زراعتها في يناير اللييوم والجلادبولس فتكون خلط تربة حياضها بقليل من السماد والرمل الابيض والاول تجود أزهاره بالقصارى •

ويزرع في شهر فبراير النباتات الدرنية فتزرع درنات الداليا في قصارى نمرة ١٥ في تربة مكونة من الطمي الجيد والرمل الابيض الناعم وبقايا النباتات العطنة بنسبة الثلث من كل منها ثم توضع في مكان دافئ بعد النمو •

وفي أواخر فبراير تزرع عقل الجارونيا والمندلية المأخوذة من أطراف قوية النمو غير رخوة وتوضع في قصارى ثمرة ١٠ ممزوجة تربتها من الطمي الجيد والرمل الأبيض الناعم مع الاحتراس في ربيها وبوجه عام يبدأ في شهر يناير والشهرين التاليين بزراعة النباتات التي يمكن تكاثرها من العقل لسكونها في هذا الوقت وفي حالة تغير نباتاتها بالقصارى فلا تخلط تربة التغير بسماد خوفا من تأثير جذور النباتات الرفيعة .
وتجدد دوائر الشيع والامتيرا ويجب التبرير بزراعة الشيع أما الامتيرا فيمتد موعد زراعتها الى الصيف .

وتزرع بزور الزهور الصيفية في أواخر فبراير ومن أهم أنواعها :
الزينيا • الكوزمبا • الونكا • عرف الديك • الجونفرينا • رجلة الزهور • الجورا • عباد الشمس • البلسم • وتثر الجذور في قصارى أو مواجير مملوءة بالطمى أو الثرى الناعم ولا تغطى بطبقة سميكة فان ذلك يؤخر انباتها ويتلف منها الكثير .

ونباتات الورد نظرا لانها تكون في أهم دور تزهيرها خلال هذا الوقت فيجب تسميدها بسماد نترات الصودا ممزوجة بقليل من الطمي وذلك نثرا بين الاشجار وتزال الازهار الذابلة للحصول على أزرار أخرى جديدة . وفي حالة اصابة النباتات حشرة المن ترش بمحلول الصابون الناعم والماء كل صباح .

ويكون البنفسج ابان ازهاره فيلاحظ ربه باعتناء واذا ما أصيبت أوراقه بمرض البقع فيعالج ذلك بنثر زهر الكبريت على الاوراق من جهتها بكرة كل صباح وتسمد بسماد الاسطبلات السائل تشجيجا لانماها .
والسنراليا :

تبدأ أزهارها في التفتح فتسمد مرتين كل أسبوع بسماد الاسطبلات السائل أو بسماد البودريت وفي حالة التسميد الاخير يجب عدم الاكثار منه خشية الضرر ويوقف تسميدها عند تكامل تزهيرها لبلوغها تمام نموها .