

تقسيم الأزهار

ينتهي خلال هذين اشهران دور ازهار الحوليات الشتوية فتحتاج النباتات للمرى نظرا لحرارة الطقس فيجب ريها بانتظام لتعويض ما تفقده الارض من رطوبة ويكون انتقاء ما ينبع من بذور الازهار وتجريمه للشمس ل تمام جفافه وخزنه للموسم القادم .
وتترك الارض بعد عزقها أسبوعين على الاقل لاعدادها لزراعة الحوليات الصيفية .

ويكون زراعة عروة من بذور الحوليات الصيفية كالقطيفة والمدنة والزنيا وغيرها تعرض الشتلة تدريجيا للشمس ثم تفرد في قصاري نمرة ٨ ومتى بلغت حجمها مناسبا تنقل الى الحياض المعد لها على مسافة ٣٠ سنتيمترا من بعضها وتتروى عقب غرسها مباشرة .

ويلاحظ في الحوليات ذات الجذور الوتدية كالبليس والرجلة زهور تزرع في قصاري نمرة ١٠ أو في الحياض المعد لها مباشرة .

وتزرع بذور الاشجار الخشبية والزنيما كالزورينا والكافور وغيرها نثرا في قصاري نمرة ٢٠ أو زراعتها في صناديق خشب ملائى بالطمى أو في حياض تحت ظل الاشجار تكون تربتها من الطمى الجيد ومق بلغت حجمها مناسبا تفرد في قصاري نمرة ١٠ أو نمرة ٨

اما الاصناف التي لا يمكن تفريدها كالبليسانس والاكسيا فتزرع بذورها في قصاري نمرة ١٠ مباشرة كل بذرتين في قصرية .

ويكون الاستمرار في غرس عقل الجارونيا والبلارجونيوم .

وتتكاثر أنواع الفيكس بالعقلة خلال شهر مارس حيث تكون النباتات في دور سكونها فتنتخب العقلة من أطراف الأفرع الناضجة .

وتتكاثر النباتات العشبية كالاستر والاسيدسترا والرودبكيا وغيرها
بتفصيصها في مارس في قصارى نمرة ١٠ أو ١٥ تبعاً لاحجامها .
السناريما — ينتهي ازهارها في أواخر مارس فتختب النباتات ذات
الازهار الجيدة وتوضع في الشمس لاخذ بزور منها ومتى تم نضج هذه
البزور تجمع في الحال .

القرنفل — تسمد النباتات الموجودة بالقصاري بسماد زبل الحمام
أو البودريت السائل مع ملاحظة عدم الاكتثار من التسميد خوفاً من
تأثير النباتات ويحسن وضع دعامات لها من الغاب الرفيع حتى لا تسقط
الفريغات لعدم صلابتها .

الاراوله — تزرع عروة أخرى منها خلال مارس اذا أريد ذلك
وينقل الناتج من العروات السابقة في قصارى نمرة ١٥ أو نمرة ٢٠ تكون
تربيتها نفسها من طمى النيل والرمل الابيض والنصف الآخر من سمام
الاسطبلات وتوالي بعد نقلها بسماد الاسطبلات أو البودريت أو زبل
الحمام السائل مرة كل أسبوع ويجب مراعاة عدم اتصال جذورها
بالارض .

الابصال — ينتهي دور تزهير أبصال الشتاء وتكون أبصال الصيف في
بدء التزهير فلاطالة موسم التزهير يلزم حفظ تربتها رطبة فتكون أنواع
الجلاديولس والدافودلس والفريزيا والايرييس وشقائق النعمان مزداته
بمختلف الالوان .

الورد — يبدأ في هذا الوقت في التزهير النباتات التي قلمت وسمدت
في ينابير الماضي فتروى بكثرة ومتى انتهى فريع من التزهير وجب
قرطه ببطواة أو مقص حاد الى ما تحت النصف ليخرج غيره قوياً حاملاً
للازهار .

وتسمد نباتات الكتا والهيديك يوم بسماد الاسطبلات وتنظف من وقت
آخر من الاوراق الجافة مع مواتها بالرى .

الدواير والاسيجة — تبدأ الاسيجة في نوها ثانية فيحتاج الامر
لتسميمها بسماد الاسطبلات المتاخر وتفص بقص الدواير لخروج
سوقاً جديدة .

وتفص الالميرا وتغرس في قصارى نمرة ١٠ أو تغرس مباشرة في
المكان الدائم مع العناية بترطيب تربتها لتكون جذوراً وثبتت بالأرض .

النجيل والليبيا — يزرع الاول بالجحرة على مسافة ٥ سنتيمترات بعد
تمهيد الأرض واعدادها لذلك ويؤلى بالرش مرتين يومياً حتى ينمو جيداً
وفي المساحات الكبيرة تعمل أحواض صغيرة مساحة كل منها متراً مربعاً
ويفرش النجيل بها وينثر التراب فوقها بواسطة الكريل ثم يسوى
بالكرك ويرش يومياً بالحر طوم الى أن ينبت ويسمى سطح الأرض بعده
بالحجر (Roller) .

وتزرع الليبيا بقطع جذورها قطعاً صغيراً باللة حادة وتنشر على
سطح الأرض وتغطى بسماد الاسطبلات وترش يومياً والأفضل زراعتها
جوراً لسرعة انباتها وضمان اختلاطها بالثرى .

الآفات :

ترش النباتات المصابة بحشرة المن بمحلول الكتاكيلا أو بالصابون