

تقديم الأزهار

تكون مسطحات الجازون في نهايتها فترق عرقا عميقا إلى أكتوبر المقبل أما المروج الحضراء من النجيل والليبيا فتكون مخضرة زاهية فيجب قصها بالسيف أو ماكينة الجازون من وقت لآخر مع مواتها بالرش طول الصيف .

وتقلع الحوليات الشتوية بعد جمع بزورها من الأزهار المستحبة وتعرض للشمس للجفاف قبل خزنها وترق الحياض مع تسميدها جيدا لزراعتها بالحوليات الصيفية التي يذرت في أوائل مارس على أبعاد من ٥٠ - ٤٠ سنتي .

ويمكن زراعة عروه في أواخر مايو ومتلها خلال شهر يونيو من بزور السنارييا والبرميولا في شوالى أو قصارى نمرة ١٥ - ٢٠ تنشر بها البزور خفينا وتوضع في مكان ظليل مع رشها بكثك ذى رشاش رفيع وبعد نموها تنقل لقصارى نمرة ٥ باعتناء زائد .

وفي نهاية هذين الشهرين تزرع العروة الأولى من الزهور الشتوية كالاترهنيوم والاقحوان والاركتوتس والكلاركيا والبنسيه والفلوكس والديمورفوتيكا والسيانس الخ .

الاراولة : تنقل نباتات العروة السابقة بقصارى نمرة ٤٠ أو ٤٥ وتكون تربتها نصفها من طمي النيل الجيد والنصف الآخر من سماد الاسطبلات وتسعد النباتات المنقوله بسماد الاسطبلات السائل أو سماد زيل الحمام السائل مرة كل أسبوع وأيضا يمكن استعمال سماد البودريت السائل الا أنه يحتاج لاعتناء زائد خوفا من احتراق جذور النباتات .

وعند بلوغ النباتات ارتفاع ١٥ سنتيمتر تنسد على دعامات من الغاب
الربيع تكون أطول من النباتات وكلما كبرت تربط بالدعامة حتى تكون
الازرار الزهرية فتقرب إلى ما تستهان بها لتشوه منظر الأزهار فيما لو
تركت وشأنها .

وإذا أريد زهور كبيرة منها فيترك على الساق فرع أو ثنان أو إذا أريد
كتلة من الزهور فيترك على الساق خمسة أو ستة فروع .

البنفسج : يتنفس من ريه تدريجياً عند انتهاء تزهيره حتى حلول فصل
الخريف .

الورد : تأخذ زهور الورد في الذبول فيقلل من رى النباتات لتنسج
قوتها عند حلول الخريف ولتعطى زهورها في الشتاء .

ويستمر في تعطیم الانواع المراد تعطیمها طول فصل الصيف .

الابصال : يبدأ في هذا الوقت بالتزهير . الميمرو كالليس والبنكرياشيوم
والبللين فتوالي بالرى ابان الأزهار لتحفظ بهيجتها .

الآفات : حشرة المن ويستعمل لها محلول الصابون أو الكتاكيلا
وحشرة البع الدقيقى ويستعمل لها مستحلب البرافين باعتناء خاص حتى
لا تتأثر النباتات من استعماله .