

شِرْكِم الْأَزْهَار

تبدأ الحوليات الشتوية خلال يناير في دور تزهيرها كالبنفسج والمنتور والانتهينوم (فم السبع) والستاريا والفلوكتس والكلاركيا والنتياريا والابيرس وغيرها . وتزهر الابصال الشتوية كالنرجس والفريزيا والليليوم والبنكرياسيوم وتكثر أزهار الورد وتكثي العجوني فنستا بأزهارها المشمشية وتزهر الكروتولايا مدنسز والكروتولاريا جلوكا وسترم اليجانز . ويزهر الانيمون والرنكيل والبدليا في فبراير .

التكلاثر : ويبدأ في أواخر يناير بغرس عقل الراولة والقرنفل الاريکاني وبعض السفل الطرفية واللينة للنباتات الزخرفية تحت الزجاج كذلك . كما تغرس عقل الورد النسر للتطعيم عليها في الخريف التالي . وتزرع بصلات الليليوم متأخرة وكورمات الجلاديوس والتيوبيروز . وفي فبراير يستمر في زراعة العقل السالفة وتزرع عقل النباتات الخشبية والزينة التي تكاثر منها كالحور والتيكوما والصفصاف النج . وعقل الشجيرات والمسلقات كالتبسبورم والأكاليفا والموراتا والياسمين ولبلابيب النباتات الزخرفية في العراء أو في الصوبة مثل الكروتون والجارونيا والسنكيريا وغيرها . وقطع النباتات الشحمية التي من فصيلة الصبارات وذلك بعد تعرضاً لها لتجوز منها يكفي لضمورها نوعاً . وفي أواخر فبراير تغرس درنات الداليا مبكراً وتفصص الكنا كذلك وتنثر بزور الحوليات الصيفية في المواجه ومنها الزينيا والونكا وعباد الشمس وعرف الديك ورجلة الذهور والقطيفة والبلزنينا وعنبر كشميري وبزور الداليا . وتزرع بزور الاشجار أيضاً في فبراير كالبوهينا (خف الجمل) واللبخ والبونسيانا والاكسينا والكنورينا والكافور والسرور والصنوبر والجريفينا والترنوب والترنلخت النج في مواجه التربة والكثير منها في الأرض مباشرة .

النقل : يبدأ من أواسط ينابير في نقل الاشجار والشجيرات الدائمة الخضراء بصلة حول جذورها والمتجردة من أوراقها تنقل ملشاً .

المروج : يقف فهو حشائش المروج (النجيل والليبيا) ويتأثر كلامها من برد الصقيع فتحدث بالمروج بقع حفراء كبيرة أو صغيرة بحسب تعرض المسطوحات لتلك المؤثرات فيجب الاقلال من الرى وإذا رويت يكون ذلك في طقس دافئ نوعاً ولوقاية المسطوحات من ضرر الصقيع تفرض عليها طبقة من السماد البلدى الصيق لعمق سنتيمتر واحد . أما مروج (الجازون) ف تكون يانعة جداً وفي حاجة دائمة لقصها وكبسها ورشها .

الاصابات : يبتدئ ظهور المن من أواسط ينابير على قمم النباتات فيجب ابادته بمجرد ظهوره ضغطاً بالأصابع أو برشه ب محلول الغاز والصابون مواراً بنسبة ١٥٪ على ٢٠٪ في الصباح أو المساء وليس وقت اشتداد الحرارة . ويظهر مرض البياض وتكثر اصابات البق الدقيقى فتعالج النباتات المصابة ب محلول الغاز والصابون مخففاً إلى ١٥٪ ويكرر الرش بحذر .

ويكثر شعران الورد فيباد بمجرد ظهوره .

عموميات : يدفأ الطقس في أواخر ذي القعده فتجزأ العصارة النباتية في الاشجار والشجيرات الساكنة وتساقط أوراق الورد فيقبل الرى ويستمر التقليم به مع التسميد .