

تقسيم النافحة

الرى : يوازن على رى مغروسات المشتل والأشجار المفروسة حديثا كل عشرة أيام مرة في أرض صفراء طينية أو كل أسبوع في أرض خفيفة . وينع الماء عن أشجار الموالع في أثناء المدة ما بين قبل التزهير بأسبوع الى أن يعقد نصف الزهر في اليوسفي أو ثلثيه في البرتقال أو ثلاثة أرباعه في الليمون الغير صائم . (وتقدر تلك المدة بنحو عشرين يوما تهيف الأشجار خلالها من رية واحدة) .

والرى بعد عقد الشمر كما تقدم يكون خفيفا جدا وعلى فترات متقاربة . ويحذر من تعطيس الأشجار ثم ريها بزيارة حيث بذلك يحل الطرح ويسقط صغيرا . وتزوى النجوم قبل التزهير ثم بعد عقد الشمار مباشرة وبخفة .

وتزوى أشجار الحلويات كل عشرة أيام بالوجه القبلي وكل أسبوعين مرة في الوجه البحري طول الصيف . وتنظم مواعيد الري على حسب معادن الاراضي وإنما يلاحظ أن مقدار المحصول مرتبط لدرجة كبيرة بمواعيد الري ومقادير المياه في كل مرة .

التسميد : يعطى لأشجار المشتل والأشجار الحديقة الغرس (عمر سنة بالحقيقة) أسمدة أزووية مثل أزوتات الصودا أو كبريتات النوشادر بمعدل كيلو لكل عشر شجرات كل شهرين مرة . وينشر حصة كل شجرة حولها في المنطقة المنتشر فيها الخامول وهذا التسميد يشجع نمو الفروع والأوراق فيكبر حجم الشجرة في زمن وجيز .

وأما الأشجار المثمرة فيمكن تسميدها بالسماد البلدى في مارس قبل التزهير مع مراعاة عدم مساس حامولها عند العزيق لثلاثة تحل كل أزهارها .

الخدمة : عزيق أراضي المشاتل ، وتقسم الأرض تحت الأشجار البالغة بعد عرقها عقب الريه الاخيرة قبل التزهير ، وتجهز خطوط لشنلل شتلات الحلويات وشتلات النارنج كذلك لا آخر فرصة في مارس .

النقل : يمكن الاستمرار في نقل أشجار الموالح بالطين أو ملشا وفي الحالة الأخيرة يقلم بعض فروع الاشجار ويقطف جميع الورق وتعمس الجذور كلها في روبة من الطين لحفظ الاغلفة الجذرية طرية ومنابت الجذور سليمة وعند القلع يراعى عدم قطع شيء من الجذور .
الغرس : يمكن استمرار غرس أشجار الموالح والتي بالقصاري مع مراعاتها بالرى على فترات قريبة .

ويغرس الموز متأخرا وأحسن شتلاته ما كان طولها من ٧٥ — ١٢ مترا ويجب فحص المزرعة المأخوذ منها للتأكد من خلوها من الدودة الشعبانية التي تسبب برم الاوراق والتلف بها على بعضها متوجهة لاعلا ومن تأثيرها أن الاوراق الوسطى الجديدة تبقى أقل حجما وطولا من سابقتها وهكذا .

ويغرس النخيل في مارس وأبريل ولو أن أنساب وقت لزراعته هو خلال أغسطس وسبتمبر حيث يلى الزراعة طقس أكثر رطوبة وأقل حرارة .

التكاثر بالبذور : تزرع في مارس بزور النارنج في تربة طمية مجهزة جيدا وبزور الليمون البلدى والليمون الحلو واليوسفى والبرتقال وبزور القشطة والجوافة والطرابلس والتفاح والكمثرى والباباز والتوت والبشملة — وتزرع بزور الاشجار الخشبية مثل الكزورينا والسنط التي كثيرا ما تلزم للحدائق ويفرد شتلتها في القصاري .

بالشتل : وتنقل الى الخطوط شتلات النارنج والكمثرى والتفاح والطرابلس زراعة مارس الماضى للطعم عليها في الحريف التالى وشتلات الجوافة زراعة الحريف الماضى لتربيتها وكذلك شتلات القشطة والتوت . وفي أبريل يمكن زراعة بزور القشطة والجوافة والتوت والباباز والبشملة والتفاح والكمثرى والطرابلس .

بالحلقة : في مارس وأبريل تغرس بالمشتل للتربية خلفات النخيل والریتون والتفاح البلدى وبزور الموز التي تجمع من حول النباتات الكثيرة أو المباعة .

بالعقل : تغرس عقل التين والترنج والليمون الحلو بنجاح يذكر في
أوايل مارس .

بالتقطيع : تطعم شتلات النارنج زراعة مارس الماضي بأنواع البرتقال
(البلدى والسكرى وأبو سره والاحمر واليافاوى) وأنواع اليوسفى
(البلدى والسترا وكلمتينا) وأصول الليمون بأنواع الليمون (البلدى
والاضاليا والمندى والكبداد والنفاث والحلو . وشتلات الكمثرى باصناف
كمثرى متازة والتفاح كذلك والطرابلس باصناف كاكى والبرقوق باصناف
برتون وكذلك خلال مارس وأبريل ومايو .

وتطعم أصول الترنج بأنواع البرتقال واليوسفى البلدى لأخذ
أشجاره وغرسها مؤقتة بين طعمة النارنج .

وتفحص العيون بعد عمليات التطعيم بنحو أسبوعين أو ثلاثة فما ينجح
منها يفك عنده الرباط ويقرط الاصل فوقه وما لم ينجح يعاد تزريره في
أبريل ثم في مايو اذا خاب لثانية مرة .

الآفات :

تظهر اصابات بالندوة العسلية السوداء على جذوع وساقان المشمش
والخوخ والبرقوق وي يكن مقاومتها بالرش بمحلول الكتاكيلا بنسبة كيلو
واحد لنحو ١٥٠ مترًا ماء (٨ صفات) أو بمحلول الغاز والصابون مخففا
بنسبة ١٥:١ ويكون الرش بهذا المحلول في ساعة مبكرة أو متأخرة من
النهار أى في غير وقت اشتداد الحرارة .

ويقاوم حفار ساق البرقوق والزيتون بادخال سلك في الثقوب
لأهلاكه .

ويرش العنبر بمحلول بردو مخففا لمنع تكاثر الامراض الفطرية
عليهم كذلك .