

## تقسيم الناكلة

مايو — يونية

الرى — تزداد حاجة الأشجار الحديثة الغرس لاء بدخول الصيف وكذلك مغروسات المشائل . وتروى أشجار المواح والحلويات التي عقدت ثمارها حديثاً ريا خفيفاً متواياً ويحب الحذر من تعطيس الأشجار لأن العطش يسبب سقوط الطرح وكذلك الري عقب العطش يسبب ذلك .

التسهيل — يعطى الشتلات الضعيفة بالمشتل ازوتات الصودا أو كبريتان النوشادر وكذلك للأشجار الحديثة الغرس

الغرس — يمكن الاستمرار خلال مايو في نقل المواح بالطين وفي غرس الأشجار التي بداخل القصاري مثل المنجو والباباز وغيرها . ويغرس الموز ولكن تلك العزوقة تم تصيفاً وقت انخفاض الأسعار .

التكاثر — يستمر في تزير الحلويات والمواح بالعين وتفلت الأربطة عن الأزرار الناجحة من تزير ابريل .

وتطعم المنجو باللصق بتجاه في مايو . وفي الامكان عرض عقلتين الان (أوائل مايو) وزراعة بنور الباباز والليمون البلدى والجوافة والتوت والقشطة والطرابلس .

## المماضيل

المواح — يستمر ثمارها في التساقط من نفسها حتى حلول شهر يونيو . أما تساقط الثمار بعد يونيو فلا يعتبر خفياً طبيعياً وإنما يكون سببه عطش شديد أو غزاره في ماء الري أو من شدة العرق بين الأشجار وتزيق حامولها . ويحب التنبه لازالة السرطانات التي كثيراً ما تنمو حول الأشجار في هذا الوقت .

المنجو — تنقل نباتات القصاري للأرض في أى وقت خلال مايو .  
والأشجار الصغيرة يعمل حولها مظلات من حطب النزرة لوقايتها من أشعة  
الشمس الشديدة .

وتطعم المنجو في هذا الأوان (مايو) بالعين وباللصق .  
والأشجار المنمرة توالي بالرى بحيث لا تعطش ولا سقطت ثمارها من  
العطش .

المشمش — تدخل ثماره دور النضج بحلول شهر مايو ويتم النضج لمعظم  
الأشجار خلال يونيو حيث يتهي محصوله .

الخوخ — تظهر ثمار الأنواع المبكرة منه لدى أوائل يونيو .  
البرقوق — بحلول يونيو تنضج ثمار البرقوق البلدى والسكرى والبكى  
والكلياكس والبابانى الذهبي .

وعند جمع ثمار البرقوق إما أن تقطف باليد أو تهز الأشجار على بساط من  
الخيش مثلاً مشدود بعيداً عن الأرض (بواسطة العمال) فتسقط عليه الثمار  
بدون أن يحدث لها ضرر ما . ولا يجمع الخوخ إلا متى تم تلويث ثمارها وصار  
بها بعض لبونة .

وإذا لوحظ اصابة علىأشجار المشمش والخوخ بالمنقرش بحلول الكتاكيلا  
ويكفى كيلو واحد (عايه) لتكلف ثمان صفائح من الماء (٣٢ جالون) . ويمكن  
الرش كذلك ب محلول الغار والصابون بمعدل ١ : ١٥ ويكون ذلك في وقت  
اشتداد الحرارة أى صباحاً أو بعد العصر .

الرمان — ابتداء من شهر مايو تراقب أزهار الرمان فما يعقد منها وتصل  
ثمرته إلى حجم الليمونة الصغيرة يبادر بمسحه وتكييسه بعناية من الشاش أو  
خيش تعمل من أي كأس القطن المزقة العديمة القيمة . ويعمل التكييس مرة  
كل ثلاثة أيام للثمار المتكونة وبذلك يسلم معظم الطرح من التلف بيرقة أبي  
دقق الرمان الأزرق اللون . وقد تستمر عليه التكييس هذه طول موسم  
التزهير — وتنال سلطانات الأشجار .

**الكافكاكى** — يكتسب اسوة بثار الرمان خلال يونيوه توقيا من الاصابة  
بذهباء الفاكهة .

**العنب** — تخفف ثمار العناقيد الضخمة المزدحمة وتقرط الفروع فيها  
بعد نقطة نزوح العناقيد لتجويده قوة النمو للثمار ويقلل الري والماء للعنب  
القريب من النضج حتى تقل حلاوته .

وفي يونيو ينضج العنب الفيومي — وتلملم أفرع الأشجار القوية النمو وترزال  
كل الفروع الجديدة الغير مثمرة والنامية على الخشب القديم .

**القططنه** — تكون في حالة أزهار في مايو ويمكن مباشرة عملية التقليم  
الصناعي بين أزهارها . ولمفهوم أن حوالي ٧٠٪ من الأزهار الملقحة  
صناعيا حسب الأصول مضمون نجاحها .

**اللوز** — يجمع محصوله أخضراً قرب أوآخر مايو .

**التين** — لدى أواخر يونيو تنضج ثمار التين البشائر .

**التقاچ** — ينضج محصول البلدى وتخفف الشاز فى الأنواع الأخرى  
المتأخرة في النضج .

**الشليليك** — يزداد محصوله كثيراً خلال مايو ويونيو وينخفض سعره  
كثيراً تبعاً لذلك .

**السفرجل والكمثرى** — تخفف ثمارها المزدحمة في خلال مايو .  
ويقاوم في الكثري صغار الساق بقتله بسلك رفيع يوجع في التقوب ذهاباً  
وإياباً عدة مرات .