

## تقويم الأزهار

(مايو)

التزهير — يزهر من التساقط علاوة على ما ذكرناه في أبريل نباتات الایومیا (وتستمر الى نوفمبر) وتيكوماراديكانز (وتستمر الى أغسطس) واستنانوتس والكليانس وتزهى التقله (حتى نوفمبر) وكف مسيم الأوتيلين وشجرة الزنزلخت وكاسيا انورا ولا تزال الأشجار المذكورة في أبريل في حالة تزهير الآن كما يزهر الزنبق ويستمر مزهرا حتى أواخر الخريف ويغزر تزهير الورد .

التكاثر — تزرع بذور الحوليات الصيفية كالقطيفة وعباد الشمس والزينا والبلزمنيا بالأرض مباشرة لتزهى في الخريف وتزرع بذور الأشجار الخشبية وبذور الزينة . مع استمرار تزيير الورد والياسمين والفل .

التقل — تنقل الحوليات الصيفية من قصارى التربة الى الأحواض بعيد ٤ ستيمترا من بعضها — وتنقل شكل القرنفل والأراوله من المواجر والقصارى الصغيرة الى أكبر منها مع سد الهبوط الحاصل فيها بتربة خصبة .

المروج — ينشط نمو حشائش المروج (التخيل والليبيا) ويظهر لون الجازون حيث يزال أو تعزق به الأرض الى عمق بعيد وتبقى حتى شهر أكتوبر فيعاد زرعها وتحتاج مروج التخيل والليبيا الى كثرة الري حتى أوائل الخريف .

جمع البذور — في هذا الشهر تنضج بذور الحوليات الشتوية كالبانسيا والفلكس واليناريا والكلاركيا والديمورفيتكا والغبرنيا وبق السبع وغيرها وتستدعى ذلك مراقبتها يوميا وجمع ما تحتاج اليه من بذورها قبل أن تسقط على الأرض .

الأبصال — ينتهى تزهير الأبصال الشتوية منذ شهر أبريل وفي مايو يقف نموها وتبدى أوراقها تذبل وهنا يمنع عنها الري وتبقى بمكانها لتزهى بدريا أو تقلع وتخزن في الرمل الجاف حتى يعاد غرسها في أكتوبر ونوفمبر من جديد .

الأصباغات — يصاب الورد بالمن والبياض وتبدو اصباغات كثيرة بالبق الدقيق ويكثر جعران الورد .

### (يونيه)

الترهيب — لا يزال معظم النباتات السابق ذكرها في الأشهر السابقة في حالة ترهيب الآن وتزهى الارستلوخيا والكوسكو والزاندريكا والكلتولاريا والكاسافستيولا والسولانم ودكروستا كروتانز . ويعزر أزهار الأبصال الصيفية والكنا . وتبتدى الحوليات الصيفية في الترهيب .

التكاثر — يمكن الاستمرار في ترهيب الورد وزراعة بذور الأشجار الخشبية وفي النصف الثانى من هذا الشهر تزرع بذور السنواريا والبرميولا وعروه (في مكان مظلل نوعا وريها بجذر حتى تثبت البذور) بدرية من الحيويا الشتوية مع ملاحظة حفظ المواجير المنزوع بها البذور .

أعمال أخرى — توالى المروج بالقص والتحديد وبالرى ويعطى السماد السائل لنباتات الأراولة والقرنفل ويعمل من متقوع السبلة بمعدل مقطف واحد من السبلة القديمة لكل أربع جالونات (صفحة) من الماء لمدة ٢٤ ساعة ويعطى مرة كل أسبوع في النصف الثانى من النهار وعلى غير عطش . وتفرس سادات من الغاب لنباتات الأراولة والقرنفل لتنمو معتدله .