

يُهْوَمْ كَهْبَلْ

الطقس :

تصل الحرارة في خلال يوليه الى أقصى حدودها ولكن لا يبلغ الجو
أن يترطب لدى أواخر يوليه بارتفاع ماء النيل .

الاعمال :

الاعمال الجارية الان هي في نقل الاسمدة البلدية وتجهيز الارض
لزراعة الاذرة . ونقاوة الطبع من القطن ودراسة المحاصيل الشتوية
وتذريتها .

المحاصيل

القطن :

في خلال هذه الفترة يكتمل غونباتات القطن وتكون اللوزات وبالنظر
لاشتداد الحرارة يكون من المفيد تنظيم الري وليكن مع الدور وبين
الدوران والدوران (٩ — ١٢ يوما) ويجب الامتناع عن الري في
أغسطس (مسرى) خوفا من تساقط اللوزات وتعرض أكثرها للضرر
دودة اللوز الحضراء .

ويتحقق القطن الباقي لآخر مرة في يوليه ويلفت لقاوته من
لطع فراش دودة الورق قبل فقسها وبعثها بأوراق النباتات .

القصب :

يفيده الري المتكرر المستقيم خلال يوليه ويقل ريه خلال أغسطس
حيث يرتفع منسوب المياه بالارض بارتفاع البيل .

الارز :

يعتني بازالة الحشائش الغريبة منه قبلما تقوى . ويزرع الارز
السبعينى خلال شهر اغسطس وحق من ابتداء منتصف يوليه .
ولا بد من تكرار الرى خصوصا للعروة الورخية منه .

البرسيم :

يدخل في دور الحصاد فيحصد محصول البذرة .

الذرة الشامية :

تجهز الارض لزراعة الذرة وهذا الشهر (يوليو) تزرع فيه
الذرة الشامية بنواحي شقى بعد طفى الشرقاوى . والبدريه منها تكون
وهي صغيرة عرضة للإصابة بالدودة القارضة (دودة البرسيم) ودودة
ورق القطن وفي أحوال كثيرة بالدودة الخضراء المسممة Laphygima exigua
وهذه الديدان تنفی في البكور وتعدم ويقل ضررها بقوه نحو
المحصول .

السمار :

ويزرع خلال يوليه وأغسطس .

الدنبية :

يزرع النوع السبعينى خلال اغسطس والبدريه (السلطانى) تمحش
في يوليه .

الحناء :

تسمد الحناء للمرة الثانية في اغسطس بمعدل ١٢ متر مكعب من
السماد البلدى للمقدان وقد يخلط السماد البلدى والكافرى بنتس الكمية
مناصفة . وفي اغسطس تمحش الحناء لأخذ محصول نيل منها ويكون
ذلك عندما يرتفع النبات لنحو ٩٠ سنتيمترا . وقطع الفروع بعد حفاف
البدى وترك في الظل لتجف أوراقها لمدة ثلاثة أيام .

السمسم :

تستمر زراعته حتى متتصف يوليه وهو يزرع بعد القمح والبرسيم والشعير بدلاً من الأذرة • ولا يرى لمدة ٤٠ يوماً عقب الزراعة بالارض الحمراء ثم بعد ذلك يرى كل أسبوعين مرة وينقطع الري قبل حصاده بنحو عشرين يوماً وفي الاراضي الرملية يزداد حاجته للري والسماد •

أعمال أخرى

الجراوة :

يستمر في زراعة عروات من الجراوة لتغذية الماشية الحلوب فيعمل منها عروة كل عشرين يوماً مثلاً بحسب الحاجة ويلاحظ أن المدة القصوى لنمو الدرة الجراوة هي أربعين يوماً •

الحبوب :

في هذا الاوان تخزن الحبوب فيجب تنظيف المخازن جيداً وترميم شقوفها ودهن جدرانها بالجير وتبخيرها ان أمكن بغاز خافق قبل وضع الحبوب بها لاحلاك السوس •

والحبوب التي يراد حفظها للتقاوى تخلط بالرماد العادى الناتج من الأفران (تراب فرن) أو بالهباب •

النحل :

تكرر الزنابير ويجب مقاومتها بواسطة المصيدة الخاصة بها وهي تصيد في اليوم آلاف منها •

ويحيل النحل للتطهير خلال يوليه • ويقطف العسل في خلال أغسطس بعد طفى نوار البرسيم ويكون حينئذ نظيفاً أياًض اللون محبوباً •

محمد بيومي على