

تقويم النفاكة

الحالة العامة :

توافق تلك المدة فصل نمو سريع في الاجزاء الخضرية للنباتات وفي الثمار كذلك ومعظم أشجار الفاكهة كالموالح والمنجو والتفاح والكمثرى والكاكى تكون ثمارها في دور التكوين بينما يجمع من حاصل العنب والبرقوق البدرى والخوخ •

وفي هذا الحين يجدر الالتفات لمقاومة ذبابة الفاكهة حيث تصاب بها ثمار الكاكى والعنب والخوخ •

المشائل :

بدخول شهر يوليه واشتداد الحر تقف عمليات التزوير بالعيون لان النجاح لا يكون مضمونا بنسبة مرضية • ويجرى العمل في تحضير أصول من الموالح والحلويات للتزوير عليها في أواخر أغسطس وسبتمبر النارج ل أنواع الموالح (يوسفى ويرتقال) والماريانا للبرقوق • والسفرجل البلدى للتفاح والكمثرى والبشملة والسفرجل الرومى • والطرابلس للكاكى بأنواعه الخ •

وتزرع بالمشتل بذور المنجو الممتازة المتخبة بمجرد أكل الثمار ويجب عدم تأخير الزراعة لاكثر من يومين قبلما ينكمش غلاف البذرة وأحيانا تزرع البزور بالمحل المستديم مباشرة ولكن الافضل زراعتها بالمشتل بالأرض على مسافة ٥٠ سنتيمترا من بعضها وبعد سنة تنقل حيث تشاء بصلاية كبيرة حاوية لكل الجذور • ويراعى استمرار الرطوبة فى الأرض طول مدة الانبات •

ويجرى تطعيم المنجو باللصق خلال أغسطس كما يصح عمل ترقيدها وهذه النباتات الناتجة لاتفصل عن أمهاتها قبل سنتين من تاريخ عملية الترقيد • وتزرع بزور التوت والباباظ والجوافة لتفرد على القصارى فى أوائل الربيع (مارس) •

الحديقة :

ويزرع النخيل بنجاح تام من منتصف أغسطس لآخر سبتمبر
ويجب انتخا ب خلفات كبيرة خصوصا حيث الارض رملية أو يتعذر
دوام الري على فترات قريبة •

التسميد :

تستفيد أشجار الحديقة اذا أعطيت سمادا أزوتيا باعتدال فينشط نموها
الحضري سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة •
ويعطى للموز سبلة بمعدل غيظ للشجرة خلال أغسطس يعزق حول
الجورة •

المحاصيل :

يجمع من محاصيل البرقوق والخوخ والعنب والمنجو والتفاح والكمثرى
والتين البرشومي والزيتون وتفاح الورد والباباز •

الآفات :

تكون أشجار الحلويات وخصوصا الخوخ والبرقوق عرضة للإصابة
بمحشرة المن السوداء والحضراء وتعالج بالرش بمحلول الكناكيلا المجهز
وتكيس ثمار التفاح والكمثرى والكاكي لوقايتها من ذبابة الفاكهة •
وأحسن أكياس لذلك ما تعمل من الشاش •
ويستمر العمل جاريا في تكيس الرمان كل ثلاثة أيام مرة • وكذلك
يستمر العمل جاريا في قتل حفار ساق الكمثرى والزيتون •

الري :

يوقف ري العنب حتى لا يكثر عصيره وتقل حلاوته ويكثر من ري
الموالح كل عشرة أيام مرة في أرض صفراء وكل خمسة عشر يوما مرة
في الارض الحمراء الطينية •

ويعطى الماء خفيفا لمثل البرقوق والخوخ خلال يولييه • ويستمر ري
الموز كل عشرة أيام مرة في الارض الطينية وكل خمسة أيام مرة في
الارض الرملية •

محمد بيومي على