

تقويم الناكهة

الطقس — بشهر مايو يتغير الطقس تغيرا جوهريا اذ ينتهى فصل الربيع ويتبدئ فصل الصيف حيث يزيد متوسط الحرارة ثلاث درجات عن متوسطها فى الشهر السابق بجميع القطر وينخفض متوسط الرطوبة بمقدار ٣-٥ درجات كذلك .

ويزيد متوسط الحرارة فى يونيه بثلاث درجات أو درجتين ونصف عن متوسطها فى مايو .

الرى — بالنظر لحالة الطقس التى يمكن ادراكها من البيان السابق تزداد حاجة الأشجار للرى على فترات متقاربة . فالمواخ يتم عقد ثمارها بحلول مايو وحينئذ تحتاج للرى الخفيف على فترات متقاربة ويصل حجم ثمار البرقوق والخوخ الى نصف أحجامها . ويلاحظ أن الرى الغزير يعقبه سقوط الثمار وخصوصا إذ عطشت قبل الرى .

الغرس — فى مايو يمكن غرس كل نباتات القصارى مثل المنجوى والزبدية والسابتا والبا باز والروبس وتفاح الورد وكل الأشجار الخشبية . ويمكن نقل أشجار المواخ والحلويات بصلاية كبيرة على شريطة سرعة غرسها بالأمكنة الجديدة — ويغرس الموز ولكن محصوله يأتى صيفا وقت كثرة الفاكهة فيباع رخيصة .

التكاثر — (١) يستمر فى تزيير الحلويات والمواخ وفك الأربطة عن العيون الناضجة من تزيير أبريل وتقرط سيقان الشتلات الناجح طعمها واتى نمت عيونها .

(٢) وتطعم المنجوى بالعين فى مايو بنجاح كبير ويلاحظ أن الأشجار الصغيرة عمر سنتين وثلاث الى خمس سنوات أكثر نجاحا فى التزيير .

(٣) وتطعم كذلك بواسطة اللصق بنجاح تام كما يمكن ترقيد الأفرخ السفلية منها ولا يفصل الفرخ عن أمه قبل سنتين من عملية الترقيد .

(٤) ويزرع بذور الباباز والليمون البلدى والجوافة والتوت والقشطة والطرابلس .

التسميد — تعطى الأسمدة الكيماوية لمقروسات المشاتل كل شهر مرة ابتداء من مايو قبل الري نثرا على طول الشتلات .

العزيق — تعزق أراضى المشاتل مرة بعد كل ريتين لمنع تشققها وإزالة الحشائش وتهرش بحارى المياه تحت الأشجار المثمرة بكل خفة لأن الشدة فى العزيق يتسبب عنها سقوط الطرح الصغير .

المحاصيل

المواخ — يستمر تساقط ثمارها من نفسها (خف طبيعى) وذلك لآخر يونيه .

ويجب التيقظ لازالة السرطانات التى كثيرا ماتمو حول الأشجار وفى سطحها صيفا . والأشجار الحديثة الغرس تروى على فترات قريبة وتهرش الأرض حولها لمنع تشققها .

المنجو — تنقل نباتاتها من القصارى لحملها المستديم وتظل الصغيرة منها (أقل من متر) من تأثير أشعة الشمس وأحسن وقاية يعمل من بوص الأذرة لرخصه . وأشجار المنجو فى الترتيب يطعم أفرعها بعيون من أنواع أجود منها والمثمرة توالى بالرى خفيفا ولكن متقاربا لتكبر ثمارها .

المشمش — بحلول مايو يجمع أول محصول من المشمش وينتهى محصوله بإتهاء يونيه .

الخوخ — يظهر محصول من المبكر لى أواخر يونيه — وتظهر على سيقانه حشرة المن الأسود فيعالج بالرش بمحلول سلفات النيكوتين بنسبه $\frac{1}{10}$ أو محلول الحجاز والصابون قوة $\frac{1}{10}$ أو محلول الكاكيلا بنسبة كيلو لعشرة صفايح .

البرقوق — في يونيه يجمع من أنواعه المبكرة النضج مثل البلدى والسكى والبكرة والكليما كس واليابانى .

وتجمع ثمار البرقوق قطعاً باليد أو بهز الأشجار على قماش مشدود بالعمال تحتها بعيداً عن الأرض حتى لا تتفجر الثمار بالاصطدام .

الرمان — يكثر أبو دقيق الرمان وهو حشرة بنفسجية الأجنحة كثيرة الحركة . فيجب ابتداء من شهر مايو مراقبة أزهار الرمان مما يعقد منها وتصل ثمرته لحجم الليمونة الصغيرة يبادر بمسحه وتكيسه بعناية بأيكاس من الشاش أو الخيش . وتجري عملية التكيس تدريجياً مرة كل ثلاثة أيام حتى ينتهى تكيس كل الثمار وبذلك تسلم الثمار من التلف .

ولا ننصح بلف الثمار بطبقة من المسكه أو بعمل الأيكاس من الورق . ومن مايو تزال سرطانات الأشجار .

الكاكى — يكيس أسوة بالرمان متى بلغ ثلثي حجمه وذلك في يونيه أو يوليه توكياً من الاصابة بدبابية الفاكهة .

العنب — يخف ثمار العناقيد الضخمة المزدحمة — ويقرط الفروع فيما بعد نمو العناقيد لتوجيه قوى الأشجار للطرح — ويقلل ريه لتركيز الحلاوة في الثمار عند نضجها .

وفي يونيه يجمع من العنب الفيومى .

القشطة — تزهر القشطة ابتداء من مايو وهنأ يعقد كمية كبيرة من الزهر عما في الأشهر التالية الشديدة الحرارة . ويمكن اجراء عملية تلقيح صناعى بين الأزهار ونسبة النجاح فيها بين ٣٥ — ٧٠٪ حسب العناية فى مباشرتها .

اللوز — يجمع محصول أخضر منه فى يونيه .

التين — يجمع محصول بشاير عند آجر يونيه .

التفاح — يجمع من التفاح البلدى وتخف الثمار فى العناقيد المزدحمة للأصناف المتأخرة منه .

الشليك — يفزر محصوله خلال هذين الشهرين ويخفض سعره كذلك .

محمد بيومى على