

تقويم الأزهار

(مايو)

التزهير — يزهر من المتسلقات علاوة على ما ذكرنا في أبريل نباتات الإيوميا (وتستمر الى نوفمبر) وتيكوما راديكانز (وتستمر الى أغسطس) واستفانوتس والكليانس وتزهى التفلة (حتى نوفمبر) وكف مريم والابوتين (حتى نوفمبر) وشجرة الزنخلت واكاسيا انورا ولا تزال الأشجار المذكورة في أبريل في حالة تزهير الآن . كما يزهر الزنبق ويستمر مزهرا حتى أواخر الخريف ويغزر تزهير الورد .

التكاثر — تزرع بذور الحوليات الصيفية كالتقطيفة وعباد الشمس والزينيا والبنميينا بالأرض مباشرة لترهف في الخريف . وتزرع بذور الأشجار الخشبية وشجيرات الزينة . مع استمرار تزيير الورد والياسمين والفل .

النقل — تنقل الحوليات الصيفية من قصارى التريسة الى الأحواض بعدد ٤ سنتيمترا من بعضها وتنقل عقل القرنفل والأراولة من المواجير والقصارى الصغيرة الى أكبر منها مع سد الهبوط الحاصل فيها بتربة خصبة .

المروج — ينشط نمو حشائش المروج (النجيل والليبي) ويظهر لون الجازون حيث يزال أو تعزق به الأرض الى عمق بعيد وتبقى حتى شهر أكتوبر فيعاد زرعها وتحتاج مروج النجيل والليبي الى كثرة الري والرش حتى أوائل الخريف .

جمع البذور — في هذا الشهر تتضج بذور الحوليات الشتوية كالبنانسيه والفلكس والليناريا والكلاريا والديمور فيتكا والفريبنيا وبق السبع وغيرها وتستدعى ذلك مراقبتها يوميا وجمع ما تحتاج اليه من بذورها قبل أن تسقط على الأرض .

الأبصال — ينتهى تزهر الأبصال الشتوية منذ شهر أبريل وفي مايو يقف نموها وتبتدى أوراقها تزيل وهنا يمنع عنها الري وتبقى بمكانها لترهر بدريا أو تقلع وتخزن فى الرمل الجفاف حتى يعاد غرسها فى أكتوبر ونوفمبر من جديد .

الاصابات — يصاب الورد بالمن والبياض وتبدواصابات كثيرة بالبق الدقيق ويكثر جمران الورد .

(يونيه)

التزهير — لا يزال معظم النباتات السابق ذكرها فى الأشهر السابقة فى حالة تزهر الآن وتزهير الأرستلوخيا والكوسكو الزانديكا والكليتولاريا والكاسيا فستيولا والسولانم ودكروستا كز بوتانز . ويفزر أزهار الأبصال الصيفية والكتا . وتبتدى الحوليات الصيفية فى التزهير .

التكاثر — يمكن الاستمرار فى تزيير الورد ، وزراعة بذور الأشجار الخشبية ، وفى النصف الثانى من هذا الشهر تزرع بذور السناريا والبرميولا وعروة (فى مكان مظال نوعا وريها بجذر حتى تنبت البذور) بدرية من الحوليات الشتوية مع ملاحظة حفظ المواجير المتزرع بها البذور .

أعمال أخرى — توالى المروج بالقص والتحديد والرى ، ويعطى السماد السائل لنباتات الأراولة والقرنفل ويعمل من متقوع السبلة بمعدل مقطف واحد من السبلة القديمة لكل أربعة جالونات (صفيحة) من الماء لمدة ٣٤ ساعة ويعطى مرة كل أسبوع فى النصف الثانى من النهار وعلى غير عطش . وتغرس سنادات من الغاب لنباتات الأراولة والقرنفل لتنمو معتدلة .