

تقوم المحاصيل

يوليه وأغسطس

الطقس — تصل الحرارة في خلال يوليه الى أقصى حدودها ولكن لا يلبث الجو أن يترطب لدى أواخر يوليه بارتفاع ماء النيل .

الأعمال — الأعمال الجارية الآن هي نقل الأسمدة البلدية وتجهيز الأرض لزراعة الأذرة . ونقاوة اللطع من القطن ودراس المحاصيل الشتوية وتدريبها .

المحاصيل

القطن — في خلال هذه الفترة يكتمل نمو نباتات القطن وتتكون اللوزات وبالنظر لاشتداد الحرارة يكون من المفيد تنظيم الري وليكن مع الدور وبين الدوارة والدوارة (٩-١٢) يوما ويجب الامتناع عن الري في أغسطس (مسرى) خوفا من تساقط اللوزات وتعرض أكثرها لضرر دودة اللوز الخضراء . ويعزق القطن الوحري لآخر مرة في يوليه ويلتفت لنقاوته من لطع فراش دودة الورق قبل فقسها وعبثها بأوراق النباتات .

القصب — يفيد تكرار الري بانتظام خلال يوليه ويقل ريه خلال أغسطس حيث يرتفع منسوب الماء الأرضي بارتفاع منسوب النيل .

الأرز — تبذل العناية في ازالة الحشائش الغريبة منه قبلما تقوى وتلقى ببذورها — ويزرع الأرز السبعيني خلال شهر أغسطس أو ابتداء من منتصف يوليه .

البرسيم — يحصد ويدرس لانحراج البذرة منه خلال يوليه .

الأذرة — تجهز لها الأرض بعد طفي الشراقي الى أحواض ضيقة (٧ × ٢ متر) أو الى خطوط بمعدل خمسة في القصبة وتزرع تقرا في الأحواض أو في جور على جانب واحد من الخطوط على مسافة ٣٠-٤٠ سم .

وتصاب الزراعات البدرية من الأذرة بالدودة القارضة في يوليه أو يونيه
وبدودة أخرى خضراء صغيرة وبدودة ورق القطن .

السمار — يزرع في أى وقت خلال يوليه وأغسطس .

المدنية — تحش البدرية في يوليه وتزرع السبعيني في أغسطس .

الحناء — تسمد الحناء لثانى مرة في أغسطس بمعدل ١٢ طنا من السماد
البلدى للقدان وأحيانا تسمد بنفس الكمية من البلدى والكفرى مناصفة :
ويحش المحصول النيلى منها في أغسطس ويكون ارتفاع النباتات حينئذ
٩٠ سم . ويكون الحصاد بعد تطاير الندى عن الورق وتشر الأفرع في مكان
ظليل لمدة ثلاثة أيام أو أربعة حتى تجف .

السمسم — تستمر زراعته لغاية منتصف يوليه ويزرع بدلا من الأذرة
بعد القمح والبرسيم والشعير وقد أخذت زراعته تنتشر في جهات شتى ويعطى
رية المحياة بعد أربعين يوما من الزراعة ثم يروى حسب أدوار المناوبات كل
١٨ — ٢٠ يوما .

الجرأوة — يزرع منها عدة عروات لتغذية الماشية الحلوب صيفا
وتصاح الجراوة للاستعمال بعد أربعين يوما .

أعمال أخرى — فى هذا الموسم تخزن الحبوب كالفول واللوبياء وغيرها
ويحسن تبخيرها قبل خبزها بغاز ثانى كبريتور الكربون ويكفى رطل واحد منه
لتحو ألف قدم مكعب من الفراغ .

والبعض يخلطون الحبوب بالملح الخشن منعا لتسويسها وتجب ملاحظة
أن الحبوب عند دراستها تكون حاوية لبويضات السوس لاصقة بها منذ
وجودها بالحقل قبل الحصاد بقليل .

وتكثر الزنايب بزراى النحل ومن الواجب مقاومتها بالمصايد — ويميل
النحل للتطريد خلال يوليه . ويجنى محصول منه خلال أغسطس .

سبتمبر

- الخدمة : اعداد الأرض لزراعة البرسيم المبكر والقمح والشعير .
الزراعة : يزرع البصل والبرسيم وكذلك البطاطس الشتوى .
الحصاد : بالوجه البحرى — يبدأ يجنى القطن وحصد السمسم والأرز
وحش السمار المنزرع فى مايو وقطع الحناء أيضا .
بالوجه القبلى — يجنى القطن ويحصد الأرز بالفيوم وكذا السمسم والتيله
والسمار المنزرع فى مايو .

أكتوبر

- الخدمة : الاستمرار فى خدمة الأرض للزراعة الشتوية .
الزراعة : يزرع بالوجه القبلى فى النصف الأخير من هذا الشهر القمح
والشعير والفل والحلبة والبرسيم والعدس . وتبذر بزور الكتان والحلبان
والترمس والقرطم وفى الوجه البحرى يزرع الفول والبرسيم والبطاطس
والكتان .
الحصاد : بالوجه القبلى يحصد الأرز بالفيوم والدينية السبعينى بها ويجنى
القطن ويحصد السمسم والسمار المنزرع بالفيوم .
وبالوجه البحرى يجنى القطن وتحصد الذرة الشامية والأرز والسمسم
والفول السودانى وتحش الدينية السبعينى .

محمد بيومى على