

## تقسيم الأزهار

### بولييه

التزهير — تزداد الحوليات الصيفية بأزهارها الجميلة ولا تزال الأបصال الصيفية (بنكراسيوم همير و كالليس . جلاديولس ) ونبات الهيديكيوم والكنا والفل المجوز في أتم التزهير . ومن الأشجار تزهر الكاسيا فستيولا .

التكاثر — تزرع بزور معظم الحوليات الشتوية ماعدا الانترهين والعايق وغيرها ذات البذور الدقيقة والقصيرة العمر فترعرع في أغسطس وسبتمبر ويمكن الاستمرار في زراعة الحوليات الصيفية بالجهات البحريّة (قرب الساحل ) حيث الحسو أكثر رطوبة . وتزرع بزور الأشجار الخشبية كذلك لأنفرضة .

الشتال — ويبدأ في تفريد شتلات النباتات الحولية الشتوية المترعرعة بدر يا في قصارى نمرة ٨ في أواخر بولييه .

الآفات — تظهر اصابات بدوادة القطن على أوراق السنزاريا والأراولة وبعض الحوليات الأخرى فيحتم ملاحظتها وتنقيتها في الصباح المبكر واعدامها .

عموميات — يمنع رى الورد حيث يحسن اراحةه بعد موسم التزهير .

### أغسطس

التزهير — تكون النباتات الصيفية في أحسن أوقات تزهيرها . وتزهر الباسفلورا والارچيريا سبلندينس والسولانم سيفورثيانم ويكثر زهر الفل المجوز والمفرد وتزهر الداليا لدى آخره .

التكاثر — يبدأ تزير الورد من جديد وتزرع بزور الانترهين والعايق والأبرس وكل البذور الدقيقة التي لا تتحمل شدة الحر . ويمكن زراعة البذور الكبيرة في الأرض مباشرة وفي جور تبعد عن بعضها ٣٠ سم على

الأكثرون على أن تخفف نباتاتها إلى واحد أو اثنين فيما بعد وتزرع بذور نخيل الزينة وبذور الأشجار الخشبية على أن تبقى بالمواجر حتى شهر مارس حيث تفرد على القصاري ويمكن زراعة مروج جديدة من الليبيا والنجليل . وعمل عقل من القرنفل والكليوس والكروتون ولكن يلاحظ أن نسبة النجاح أقل مما لو غرس في الربيع ويمكن عمل وغرس عقل من شجرة الأثل طول الخريف .

أعمال أخرى — تجنب المشابرة على تشجيع نمو الارواحة والنباتات الخرفية والأوراق بالسماد السائل ( الناتج من تقيع السبلة العتيقة ) ويستمر في تفريز الحولييات الشتوية ومنها السنزار يا مع الحذر في رى شتلاتها وتحفظ بمكان ظليل حتى تقوى زنيبات الأوراق وتدب جذورها حيث تتعرض للجو تدريجياً بعد نحو شهر . وتنصح بذور بعض الحولييات الصيفية وهنا يبادر بقطف الأزهار الدابلة ب مجرد رؤيتها لملاءفة تعجيز النباتات عن الترهير وتحتاج الحولييات المذكورة للرى الكثير وتنقية الحشائش من بينها . وتعمل النقوش بنباتات الالميره على ارض المروج اذا رغب في ذلك .

الآفات — تكثر اصابات المرن في هذا الوقت وتعالج النباتات منه برشها بمحلول الغاز والصابون مخففاً بنسبة ١٠ على ٢٠ أو بمحلول الكاتاكيلا بنسبة ١٥ على ١٥ مبكراً في الصباح أو قرب آخر النهار ولا يأس من تكرار الرش .

#### سبتمبر

الاستمرار في تطعيم الورد وزراعة العروة الثانية من الورد النسنـ — والاستمرار في زراعة بذور الأشجار الخشبية ومسطحات النجليل والليبيـ — موصلة تكاثر الأشجار بالترافقـ .

الاستمرار في نقل العقل التي غرست في الشتاء الماضي إلى القصاري — زراعة العروة الأولى من البسلة — زراعة الحوليات الشتوية الآتية التي تنمو بجودة الآن كالكلاركيا والعليق والجودشيا والاستانس واللوبليا والنفيزيا . وتكاثر الجربيرا والفستجيا بالفسائل — تجهيز الأرض لزراعة البنفسج من الفسائل — يزرع الجازون والأبصال الشتوية .

### أكتوبر

الاستمرار في تطعيم الورد . البدء في نقل الورد وتسويقه وتقطيعه . الاستمرار في زراعة مسطحات الليبيا .  
زراعة الحوليات الشتوية الآتية (الكلاركيا. العليق. الجودشيا. الاستانس اللوبليا. النفيزيا) .

زراعة الحوليات الشتوية وزراعة البنفسج وزراعة بذور الجازون وزراعة أبصال النرجس . تكاثر الجارونيا والمحى علم والمندلية من العقل وزراعة درنات السيكلامن ما

م ب م