

تقويم الحقل والفاكهة والخضر ونباتات الزينة

المحاصيل

القطن — يستمر زراعة القطن بشمال الدلتا حتى منتصف مايو وهذه زراعة ولا شك وخرية . وبعض المزارعين بمصر الوسطى (بجنوب الدلتا) يزرعون القطن بعد حصاد الفول البلدى حوالى أول مايو وتلك زراعة وخرية كذلك

أما الزراعات البدرية فتزهر فى مايو ويعم تزهيرها فى يونيه بينما تخف الزراعات الوخرية فى مايو ويرقع الميit من الجور وبشمال الدلتا يباشرون الترقيع فى يونيه

ويجىء أول دور لدودة ورق القطن فى مايو وثانى وثالث دور لآخر يونيه فتضع أنثى الفراش بيضها على ظهور الاوراق متلاصقا فى شكل لطلعة وتغطيه بطبقة وبرية سمراء لوقايتها

أما رى القطن فليس من السموات تعطيشه بالاعتماد على أدوار المناوبات الطويلة ويحسن ريه فيما بين كل دورين أعنى كل تسعة أيام أو عشرة بأرض صفراء طينية . ولا يخشى من غزارة الرى إلا فى شهر مسرى وقت ارتفاع منسوب الماء الأرضى بارتفاع النيل

القصب : يسمد فى مايو بسماد كىماوى ككثرات الصودا بمعدل ١٥٠ كيلو جرام للفدان ويوالى بالرى على فترات منتظمة قريبة (١٢ — ١٥ يوما) ويعزق لآخر مرة فى مايو فتصبح النباتات فى وسط المصاطب الأرز : يزرع الصيفى خلال مايو وأوائل يونيه ولكن الزراعة المبكرة

أفضل ويجب التيقظ لدودة الجذور فإذا أصابت الزراعة يمنع الري ٣ - ٤ أيام
لتحفظ الأرض نوعاً وتموت الديدان

ولا تهمل الحشائش التي تنمو تحتول الأرز بالأولاد . وفي حالة تأخير
الزراعة فكثيراً ما تبذر التقاوى جافة

القول السوداني - يزرع متأخراً (في مايو) والمبكر تنقى منه الحشائش
ويوالى بالري على فترات قريبة حيث تتوقف كثرة المحصول على كثرة ريه
في أوائل عمره

الحناء : تهرش الأرض بين النباتات في الزراعات الجديدة وتسمد
بالسماد البلدى بمعدل ٦ طن (٦٠ غبيط بالجمار) ينشر على عموم الأرض أما
الزراعة القديمة العقر فتعطى ١٢ طن سماد بعد إزالة المحاصيل المؤقتة (كالشعير
والقول) وكثيراً ما يعطى سماد سلفات النوشادر بمعدل ١٠٠ كيلو تكبيراً
بدل السماد البلدى .

السمسم : يزرع خلال يونيه وتمتد زراعته بأخر يوليه وأنسب الأراضى
له هى الطيمية والمرملة . وتسمد له الأرض بعد البرسيم بنحو ١٠ طن سماد
بلدى أو ١٥ طن بعد قح .

ولتقاوى الفدان يكفي ملوة واحدة ونصف تنثر على عموم الأرض
مخلوطة بضعف حجمها من الرمل وتزحف الأرض وتقسم الى أحواض وتروى

الذرة الصيفى : تزرع خلال مايو والزراعة البندرية تثمر في يونيه

الذرة النيلى : تجهز أراضيها في يونيه

الشعير والقمح : الأول يتم حصاده في مايو والثانى في يونيه

أعمال أخرى : في مايو يدرس الفول والحلبة ويحصد الكتان والعصفر
والتوم وفي يونية يتم نضج البصل البحيرى
ويقل لبن الماشية بدخول الصيف ويميل النحل للتطريد وتوقف عملية
التفريخ بالمعامل

الفاكهة في مايو - يمكن زراعة بذرة التوت والروبس والبشملة وتفرد
شتلات الزيتون والجوافة في الأصص
من الممكن إعادة تطعيم الموالح وكذ الحلويات التي لم ينجح طعمها في
الخريف الماضى

وتزداد حاجة الأشجار للرى ويمنع رى الأشجار المزهرة إلا إذا احتاجت
التربة للرى وكان الجو حاراً - ويمكن الاستمرار فى غرس الموز ولو أن
ذلك متأخراً

وتطعم المنجو باللصق والعين

يستمر تزهير الرمان والتين والقشطة والبيكان - ويبدأ فى جمع الشمس
والتفاح الأحمر والفرمبواز والكريز واللوز ويستمر جمع الشليك والبرتقال
البلدى والبشملة

وتظهر فى أواخره بوادر التين بالوجه القبلى

الخضروات فى مايو - يمكن زراعة الخيار والبطيخ والرجلة والملوخية
والباذنجان والفلفل والكوسة والفاصوليا ويظهر الباذنجان العقرو بوادر الشام
نباتات الزينة فى مايو - الاستمرار فى تطعيم الورد - زراعة الورد
الثالثة من الأزهار الصيفية - زراعة بزور الأشجار الخشبية - تفريدها الحلويات
الصيفية جمع البزور الشتوية - زراعة شتلات الحلويات الصيفية زراعة الأبصال

الصيفية - زراعة النجيل والليبيا في المسطحات - البدء في تكاثر الأشجار والشجيرات المتسلقات بالتراويد - عزيق مسطحات الجازون لانتهاؤ نمو

الفاكهة في يونيو - يوقف تطعيم الموالح لاشتداد الحرارة - إزالة سرطانات النباتات المطعومة - مولات الأشجار بالرى - جمع ثمار اللوز والمشمش - يبدأ نضج العنب الأسود - والبناتي - أما العنب الفيومي فيظهر في أواخر الشهر - وتظهر بوادر التين الشوكي في الثلث الثاني من الشهر ويتم نضجه في الثلث الأخير منه ويجمع ثمار الباباظ والروبس والتين (البوني) والشليك والليمون العجمي والتفاح الأحمر

الخضروات في يونيو - يمكن زراعة الخيار والقثاء والرجلة والمواخية والبادنجان والفلفل والكوسة والفاصوليا واللويا وتشتل نباتات الكرفس والكراث أبو شوشة والكرنب البلدى والقنبيط المبكرة

نباتات الزينة في مايو - الاستمرار في تطعيم الورد وزراعة بزور الأشجار الخشبية وتقريد الحوليات الصيفية وزراعة مسطحات الليبيا والنجيل إزالة ما جف من الابصال الشتوية وحفظها في الرمل الأبيض للموسم القادم تسميد الأراولة - مواصلة تكاثر الأشجار والشجيرات بالتراويد - زراعة العروه المبكرة في الازهار الشتوية