

الصفات الخضرية للأقطان المصرية وللنباتات الغريبة في حقول القطن

للدكتور محسن عباس الديبى

خلال سنوات طويلة ترجع إلى القرن الماضي اكتسبت الأقطان المصرية سمعة عالمية تؤهلها لها متانة التيلة وطولاها ونعومتها وقلة عدد العقد بها . ورغم أن الانتاج القطني المصري في السنوات الحديثة أصبح لا يتجاوز في معظمها أكثر من ٣,١٪ من الانتاج العالمي ، إلا أن جمهورية مصر العربية تعتبر المصدر الرئيسي الذي يمد العالم باحتياجاته من الأقطان طويلاً التيلة بصفة عامة ، والأقطان الأطول تيلة بصفة خاصة ، إذ تمثل الأقطان المصرية أكثر من ٢١,٩٪ من جملة إنتاج العالم من هذين الطرازين .

ويمكن تقسيم الأقطان المصرية فيما بينها إلى ثلاث طبقات حسب طول تيلتها ، وهي :

١ - أقطان متوسطة التيلة - يزيد طول تيلتها عن $\frac{1}{2}$ بوصة ، وهي أقطان : الأشموني ، وجذرة ٦٦ ، وجذرة ٧٢ .

٢ - أقطان طويلة / وسط التيلة - يزيد طول تيلتها عن $\frac{1}{2}$ بوصة ، وهي أقطان : جذرة ٦٧ ، وجذرة ٦٩ ، والدندرة ، وجذرة ٧٥ .

٣ - أقطان طويلة التيلة - يزيد طول تيلتها عن $\frac{3}{4}$ بوصة ، وهي أقطان : جذرة ٤٥ ، وجذرة ٦٨ ، وجذرة ٧٠ .

* الدكتور محسن عباس الديبى : كبير الباحثين ومدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية ومسكر تحرير تحرير مجلة الفلاح .

١ - الأشموني :

أقدم الأقطان المصرية ، ظهر عام ١٨٦٠ ، ويعتبر أب الأقطان المصرية جميعها ، قلت مساحتها كثيراً في الأعوام الأخيرة . يستخدم في مصانع الغزل المحلية في إنتاج الملابس العادية والجوارب والفانلات ، ويتميز بسهولة تشغيله لخلوه نسبياً من العقد .

وفيما يلي الصفات الخضرية للأشموني :

البادرة : الأوراق الفلقية خضراء داكنة لامعة ، خالية من البقعة الحمراء .

الأوراق : متوسطة الحجم ، خضراء فاتحة ، وتفصيصها عميق نوعاً ، ذات ثلاثة فصوص غالباً .

النبات الكامل : شجيري ، متوسط في نموه الخضرى ، أفرعه التثريبة تبدأ من عقدة منخفضة على الساق هي العقدة السادسة عادة .

الزهرة : أنبوبية الشكل ، صفراء اللون ، وبقاعدة البتلات من الداخل بقعه حمراء داكنة .

اللوزة : مخروطية الشكل ، مستديقة القمة ، لونها فاتح نوعاً ، لامعة عليها غدد زيتية كثيرة ، واضحة جداً . وتزن اللوزة الواحدة حوالي ٢,٥ جرامات في المتوسط .

البذرة : صغيرة ، تزن المائة منها حوالي ٩,٥ جرام ، داكنة اللون ، تكاد تكون عارية من الزغب إلا من خصلة صغيرة سمراء على القمة والقاعدة .

٢ - جيزة ٦٦ :

هجين بين جيزة ٤٦ (أ) وجيزة ٤٧ . من الأقطان متوسطة التيلة . أدخلت زراعته في اكثار موسع عام ١٩٦٣ ، ثم انتشرت زراعته في مصر الوسطى بعد ما يثبت نتائجه ارتفاع محصوله عن الأشموني ، وتفوقه في الصفات الغزلية عليه .

وفيما يلي أهم الصفات الخضرية لجذرة ٦٦ :

البادرة : الأوراق الفلقية خضراء ، حالية من البقعة الحمراء .

الأوراق : متوسطة الحجم ، قائمة نوعاً (أعمق من الأشموني) ، والتفصيص متوسط العمق ، والفصوص عريضة نوعاً ذات ثلاثة فصوص عادة .

النبات التكامل : قوى النمو ، وأفرعه المثيرة كثيرة تبدأ من العقدة السادسة ، غالباً يعطي في آخر الموسم أفرعاً خضراء تحمل أفرعاً صغيرة .

الزهرة : أنبوبية الشكل ، صفراء اللون ، بقاعدة البتلات من الداخل بقعة حمراء داكنة .

اللوزة : متوسطة الحجم ، غير مستدقة ، لها أكتاف بسيطة ، خضراء لامعة ، عليها غدد كثيرة ، واضحة جداً . ويبلغ متوسط وزن اللوزة الواحدة ثلاثة جرامات .

البذرة : متوسطة الحجم ، أكبر قليلاً من بذرة الأشموني ، وزن المائة منها ١٠,٩ جرامات . لون القصرة بني غامق ، والزغب كثيف في كل من القمة والقاعدة والخط الواصل بينهما ، لون الزغب مسمر ، وقد يكون محضراً أحياناً .

٣ - جذرة ٧٢ :

هجين بين جذرة ٦٦ (أ) وجذرة ٤٧ . من الأقطان متوسطة التيلة ، مبكر النضيج ، يتميز بعلو محصوله من القطن الشعير وارتفاع صافي حلجه مع تفوقه في متانة الغزل على الأشموني . بدأ في إكثاره على نطاق تجاري عام ١٩٧١ ، ووصلت مساحته إلى ١٠٢,٨٩٠ فدان عام ١٩٧٥ ، ولكن أوقفت زراعته في موسم ١٩٧٦ ، ثم تقررت إعادة زراعته في الموسم الحالي (١٩٧٧) في مركز مليوي فقط بمحافظة المنيا .

نباتاته قصيرة ، تبدأ فروعها الثرية من العقدة السادسة أو السابعة ، ولوزتها كبيرة الحجم ، مخروطية الشكل . والبذرة متوسطة الحجم ، تميل إلى السواد ، يكسو الزغب جزءاً من القمة والقاعدة والخط الواصل بينها . ولون الزغب أبيض مسمر .

٤ - الدندرة :

نشأ بالانتخاب الفودى من صنف جيزة ٣ المنتخب أصلاً من الأشمونى من الأقطان طويلة / وسط التيلة . يزرع في المناطق الجنوبية من الوجه القبلى لتحمله درجات الحرارة العالية في تلك المناطق . مبكر النضج جداً . ويستعمل في صناعة الملابس الداخلية ، وخيوط التريكو ، وملابس الرياضة .

وفيما يلى أهم الصفات الخضرية للدندرة :

البادرة : الأوراق الفلقية خضراء ، حالية من البقعة الحمراء .

الأوراق : شبيهة بأوراق الأشمونى ، ولكنها أكبر حجماً ولونها أكثر دكناً .

النبات الكامل : طويل ، ذو سلاميات طويلة ، يتوجه في نموه إلى أعلى . لون الساق والأفرع مشrub بحمرة . تبدأ الأفراع الثرية من العقدة السابعة تقريباً .

الزهرة : مثل زهرة الأشمونى .

اللوزة : شبيهة بلوزة الأشمونى ، وتزن اللوزة الواحدة نحو ٢,٧ جرامات .

البذرة : صغيرة الحجم ، تزن المائة منها ٩,٨ جرامات ، والقصيرة ملساء ذات لون داكن جداً ، وتکاد تخلو من الزغب إلا من خصلة صغيرة ذات لون أسمر فاتح عند القمة والقاعدة .

٥ - جيزة ٦٧ :

هي جين بين جيزة ٥٣ (ب) وجiezة ٣٠ ، من الأقطان طويلة / ووسط التيلة . زرع في اكتوار موسع عام ١٩٦٤ بعد أن بینت التجارب نفوذه في

المحصول ، وامتيازه في معدل حلجه على جيزة ٤٧ الذي كان الصنف الرئيسي طويل / وسط التيلة بالدلتا بين عامي ١٩٦٠ ، ١٩٦٦ .

وفيما يلي أهم الصفات الخضرية لجيزة ٦٧ :

البادرة : الأوراق الفلقية خالية من البقعة الحمراء .

الأوراق : كبيرة الحجم ، خضراء بها زرقة واضحة مميزة .

النبات الكامل : قوى النمو الخضرى ، وينخرج الفرع المثوى الأول من العقدة السابعة أو الثامنة :

الزهرة : أنبوبية الشكل ، صفراء باهتة نوعا ، بقاعدة البتلات من الداخل بقعة حمراء داكنة .

اللوزة : كبيرة الحجم وتعتبر أكبر وزن لوزة بين الأقطان المصرية ، خضراء فاتحة اللون ، لامعة ، تميل إلى الاستدارة في قاعدتها ومسحوبة من أعلى ، الغدد قليلة ، وزن اللوزة الواحدة حوالي ٣,٦ جرامات في المتوسط :

البذرة : كبيرة الحجم تزن المائة منها ١١,٥ جرامات ، ذات شكل مخروطي منبتعج لون القصرة بني قاتم في معظم البذرة ، ولون الزغب أبيض ، وقد يكون أبيض مخضر ، وهو كثيف في القمة ، ويقل تدريجيا على بقية سطح البذرة .

٦ - جيزة ٦٩ :

هجين بين جيزة ٥١ (أ) وجiezة ٣٠ ، من الأقطان طويلة / وسط التيلة . تيلته أنعم من تيلة جيزة ٦٧ وأحسن منه متانة الغزل مما يحقق طلب الغزاليين الذين يرغبون في نعومة التيلة النسبيّة في طبقة الأقطان طويلة / وسط التيلة .

أدخلت زراعته في نطاق تجاري عام ١٩٦٦ حين وجد من المفيد التوسع في زراعة جيزة ٦٩ - بجانب صنف جيزة ٦٧ - ليتوفر للغزاليين طلباتهم المتزايدة في خصائص التيلة ، خصوصا بعد أن بينت التجارب أن

جِيَزَةُ ٦٩ يُمَاثِلُ جِيَزَةَ ٦٧ فِي الْمَحْصُولِ الْعَالِيِّ مَعَ ارْتِفَاعِ مَعْدُلِ حَلْجَهِ الَّذِي يُعْتَبِرُ أَحْسَنَ صَافِ حَلْجٍ عُرْفَتْهُ أَقْطَانُ مَصْرُ التِّجَارِيَّةُ .

وَفِيهَا يَلِي أَهْمَ الصَّفَاتِ الْخَضْرَيَّةِ جِيَزَةُ ٦٩ :

الْبَادِرَةُ : الْأُورَاقُ الْفَلْقِيَّةُ خَالِيَّةُ مِنَ الْبَقْعَةِ الْحَمْرَاءِ .

الْأُورَاقُ : مَتْوَسِطَةُ الْحَجْمِ ، خَضْرَاءُ فَاتِحَةُ الْلَّوْنِ ، وَالتَّفْصِيصُ غَائِرٌ نُوْعًا .

الْبَنَاتُ الْكَامِلُ : قَوِيَ النُّوُّ الْخَضْرَى ، طَوِيلُ السَّلَامِيَّاتِ ، الْأَفْرَعُ الشَّعْرِيَّةُ كَثِيرَةٌ ، وَيَخْرُجُ الْفَرْعُ الشَّمْرِيُّ الْأَوَّلُ مِنَ الْعَقْدَةِ السَّابِعَةِ عَادَةً .

الْرَّهْرَةُ : أَنْبُوبِيَّةُ الشَّكْلِ ، فَاتِحَةُ الْلَّوْنِ نُوْعًا ، وَيَوْجُدُ بِقَاعَدَةِ الْبَلَاتِ بَقْعَةُ حَمْرَاءُ دَاكِنَةٌ .

الْلَّوْزَةُ : مَتْوَسِطَةُ الْحَجْمِ ، مَخْرُوطِيَّةٌ ، مَسْتَطِيلَةٌ ، وَمَسْتَدِقَةٌ ، لَامِعَةٌ جَدًّا ، وَعَلَيْهَا غَدَدٌ وَاضْحَىَّةٌ . وَتَزَنُ الْلَّوْزَةُ الْوَاحِدَةُ حَوْالَى ٣,٣ جَرَامَاتِ .

الْبَذَرَةُ : كَبِيرَةُ الْحَجْمِ ، وَتَزَنُ الْمَائَةُ مِنْهَا ١٠,٦ جَرَامَاتِ ، كَثِيفَةُ الرَّغْبَ مَاعِدًا جَزءٌ بَسِيطٌ (٢٣٪ مِلْبَسَةٌ تَقْرِيبًا) . وَلَوْنُ الرَّغْبَ أَيْضًا مُخْضَرٌ .

٧ - جِيَزَةُ ٧٥ :

هُجَنٌ بَيْنَ جِيَزَةَ ٦٧ وَجِيَزَةَ ٦٩ ، وَمِنَ الْأَقْطَانِ طَوِيلَةً / وَسْطُ التَّيْلَةِ . أَدْخِلَ هَذَا الصَّنْفَ فِي الزَّرَاعَةِ عَامَ ١٩٧٥ ، وَابْتِداَءًا مِنْ عَامِ ١٩٧٦ أَخْذَ بِهِ تَدْرِيجِيًّا مَحْلُ جِيَزَةَ ٦٧ فِي مَحَافَظَةِ المُنْوفِيَّةِ . يَعْطِي جِيَزَةُ ٧٥ أَحْسَنَ مَحْصُولٍ مِنَ الْقَطْنِ الشَّعْرِ بَيْنَ سَلَالَاتِ وأَصْنَافِ الدَّلَلَةِ طَوِيلَةً / وَسْطُ التَّيْلَةِ وَوَرَثَ صَفَقَى ارْتِفَاعِ صَافِ الْحَلْجِ عَنْ جِيَزَةَ ٦٩ وَكَبِيرَ حَجْمِ الْلَّوْزَةِ عَنْ جِيَزَةَ ٦٧ ، وَيَمْثُلُ تَحْسِينَنَا كَبِيرًا فِي مَتَانَةِ الغَزْلِ عَنْ أَبُوِيهِ .

الْبَنَاتُ قَوِيَّةُ النُّوُّ الْخَضْرَى ، كَثِيرَةُ الْأَفْرَعُ الشَّمْرِيَّةِ ، وَيَخْرُجُ الْفَرْعُ الشَّمْرِيُّ الْأَوَّلُ مِنَ الْعَقْدَةِ السَّابِعَةِ عَادَةً . الْلَّوْزَةُ كَبِيرَةُ فِي حَجْمِهَا ، أَكْبَرُ

حجماً من لوزة جيزة ٦٩ . البذرة كبيرة الحجم ، كثيفة الرغب ، ولون الرغب أبيض مخضر .

: جيزة ٦٨

هجين بين قطن المنوف وجيزة ٥٦ . من الأقطان طويلة التيلة . زرع في اكتار موسع عام ١٩٦٤ بعد أن بنت التجارب تفوقه على المنوف في الحصول ومعدل الحلنج ، وهو أقصر قليلاً في طول التيلة من المنوف ، ويقاد يماثله في خصائص التيلة ، مع تفوقه قليلاً في متانة الغزل على أحسن سلالات المنوف .

: وفيها يلي الصفات الخضرية لجيزة ٦٨

البادرة : الأوراق الفلقية بها بقعة حمراء صغيرة واضحة .

الأوراق : متوسطة الحجم ، فاتحة اللون نوعاً ، تفصيصها غائر .

النبات الكامل : شجيري نوعاً ، متوسط النمو الخضرى ، متجانس في طول نباتاته ، وينخرج الفرع الشمرى الأول من العقدة السابعة .

اللوزة : متوسطة الحجم ، باهته اللون ، مخروطية الشكل ، والعدد الريتية واضحة جداً وغائرة . وتزن اللوزة الواحدة حوالي ٣,٣ جرامات .

البذرة : صغيرة نسبياً في الحجم ، تزن المائة منها ٩,٩ جرامات . لون القصرةبني مسود مطفى ، ويوجد زغب لونهبني فاتح – وقد يكون مائلاً للأخضرار – في القمة والقاعدة مع رغب بسيط على الخط الواصل بينهما .

: جيزة ٧٠

هجين بين جيزة ٥٩ (أ) وجيزة ٥١ (ب) . من الأقطان طويلة التيلة . بدأ في زراعته في اكتار موسع عام ١٩٧١ عندما دلت نتائجه على تفوقه في محصول القطن الشعير وصافي الحلنج على المنوف ، مع أفضليته في متانة

الغزل على المنوف وجزة ٦٨ ، وهو أطول تيلة من جزءة ٦٨ وبما يعادل المنوف في طول التيلة ، ولكنه أخف منهما .

نباتات جزءة ٧٠ متوسطة النمو الحضري تزيد في طولها عن جزءة ٦٨ ، وببدأ تفريعها المترى من العقدة السابعة . البذرة مخروطية مبسطة ، متوسطة الحجم في غالبيتها ، بنية اللون ، يكسو الرغب معظم القمة والقاعدة ، وللون الرغب أبيض مسمى .

تزايدت مساحة جزءة ٧٠ تدريجياً حتى أصبح حالياً الصنف السائد من الأقطان طويلة التيلة مما أدى إلى إيقاف زراعة المنوف ابتداء من عام ١٩٧٧ .

١٠ - جزءة ٤٥ :

هجين بين جزءة ٢٨ وجزءة ٧ . من الأقطان طويلة التيلة . متاز في جودته ويعتبر أفال أصناف القطن في العالم ، ويستعمل لإنتاج المنسوجات الفاخرة وصناعة خيوط التطريز وبعض المنتجات التي تتطلب خيوطاً طويلة ناعمة متينة .

وفيما يلي الصفات الحضريّة لجزءة ٤٥ :

البادرة : الأوراق الفلقية حضراء ، خالية من العقدة الحمراء .

الأوراق : لونها أخضر فاتح نوعاً ، صغيرة الحجم نوعاً ، جلدية وبها بقعة حمراء فاتحة نوعاً وصغيرة جداً عند اتصال النصل بالعنق .

النبات الكامل : متوسط النمو ، والأفرع الثيرية تبدأ من العقدة التاسعة تقريباً .

الزهرة : صفراء أنيبوبية بقاعدتها بتلاتها من الداخل بقعة حمراء صغيرة .

اللوزة : حضراء ، مستطيلة الشكل مستدققة الطرف ، غددتها الزيتية واضحة ، وتزن حوالي ٢,٣ جرامات .

البذرة : صغيرة الحجم ، تزن المائة منها حوالي ٨,٨ جرامات ، في قاعدتها زغب أبيض مائل للانخضرار .

ويبي الجدول الآتي متوسط محصول الفدان وصفات الحلنج وصفات التيلة والغزل لأصناف القطن التجارية خلال المواسم الخمسة (١٩٧٢-١٩٧٦) :

مَحْصُولُ الْأَصْنَافِ الْمِصْرِيَّةِ وَصَفَّهَا الْفُولِيَّةُ (مَوَسِّعٌ - ١٩٧٦ - ١٩٧٩)

قِرَاءَةُ الْمِكْرُونِير	طُولُ الْتِبْلَةِ وَزَنُ الشُّعْرَةِ	الْمِسْطَالَةُ	مَثَانَةُ النَّوْلِ	٦٠ مَسْرَحٌ	١٢٠ مَعْشَطٌ	مَعْصُولُ الْفَدَانِ	مَعْصُولُ الْمَلْجَ	رَطْلٌ	الصَّنْفُ		أَقْطَانُ طَرِيلَةِ التِّبْلَةِ :
									شَهْرٌ	قَدْرٌ	
١٣٣	٣٩,٩	٣٩,٩	٧,٥	٢٦٧٥	٣١٣٥	١٠٢,٨	٧,٨	جزءٌ ٤٥
١٣٤	٣٨,٤	٣٨,٤	٦,٥	٢٣٧٥	٢٩٣٧	١١٤,٩	٦,٢	جزءٌ ٧٠
١٣١	٣٥,٧	٣٥,٧	٦,١	٢٢٠٠	٢٧١٥	١١٠,٧	٥,٥	جزءٌ ٦٨
١٣١	٣٦,٩	٣٦,٩	٤,٧	٢٠٥٥	٢٥٣٥	١٠٥,٥	٣,٥	المُنْرَفُ (١)
١٣٣	٣٦,٩	٣٦,٩	٦,٣	أَقْطَانُ طَرِيلَةٍ / وَسْطُ التِّبْلَةِ :
١٣٤	٣٥,٥	٣٥,٥	٦,٣	جزءٌ ٦٤
١٣٤	٣٥,٨	٣٥,٨	٦,٦	جزءٌ ٦٧
١٣١	٣٤,٢	٣٤,٢	٦,٣	الْدِنْدَرَةُ ...
١٣١	٣٥,١	٣٥,١	٦,٣	جزءٌ ٥٧ (٢)
١٣٣	٣٥,٥	٣٥,٥	٦,٣	أَقْطَانُ مُتوسِّطَةِ التِّبْلَةِ :
١٣٤	٣٤,٥	٣٤,٥	٦,٣	جزءٌ ٦٦
١٣٤	٣٥,٨	٣٥,٨	٦,٦	جزءٌ ٦٧ (٣)
١٣١	٣٤,٢	٣٤,٢	٦,٣	الْأَغْوَافُ ...
١٣١	٣٥,١	٣٥,١	٦,٣	(١) أَقْدَتْ زَوْدَاتْ طَام١٩٧٧، ثُمَّ أَمْهَدْ زَرَادَهْ فِي سَرْكَرِ مُلُوكِيَّهْ طَام١٩٧٧.
١٣٣	٣٤,٣	٣٤,٣	٦,٣	(٢) أَكْتَرْ طَلَقَ تَجَارِيَّهْ طَام١٩٧٥.
١٣٤	٣٤,٦	٣٤,٦	٦,٣	(٣) أَكْتَرْ طَلَقَ تَجَارِيَّهْ طَام١٩٧٦.
١٣٤	٣٤,٦	٣٤,٦	٦,٣	(٤) أَكْتَرْ طَلَقَ تَجَارِيَّهْ طَام١٩٧٧.
١٣١	٣٣,٩	٣٣,٩	٦,٣	(٥) أَكْتَرْ طَلَقَ تَجَارِيَّهْ طَام١٩٧٦، ثُمَّ أَمْهَدْ زَرَادَهْ فِي سَرْكَرِ مُلُوكِيَّهْ طَام١٩٧٧.
١٣١	٣٣,٧	٣٣,٧	٦,٣	(٦) أَكْتَرْ طَلَقَ تَجَارِيَّهْ طَام١٩٧٧.
١٣٣	٣٣,٧	٣٣,٧	٦,٣	(٧) أَكْتَرْ طَلَقَ تَجَارِيَّهْ طَام١٩٧٧.
١٣٤	٣٣,٩	٣٣,٩	٦,٣	(٨) أَكْتَرْ طَلَقَ تَجَارِيَّهْ طَام١٩٧٧.
١٣٤	٣٣,٩	٣٣,٩	٦,٣	(٩) أَكْتَرْ طَلَقَ تَجَارِيَّهْ طَام١٩٧٧.
١٣١	٣٣,٧	٣٣,٧	٦,٣	(١٠) أَكْتَرْ طَلَقَ تَجَارِيَّهْ طَام١٩٧٧.

الغريبة في القطن المصري

١ - القطن الهندى والقطن الهندى المجن (شكل ١) :

نباتات الهندى قصيرة ضعيفة النمو ، أوراقها زغبية قليلا ، تفصيصها عميق ، لونها فاتح نوعا ، بها بقعة حمراء واضحة عند اتصال العنق بالنصل ، ويكتفى اللون الأحمر على عنق الورقة . والزهرة عاجية اللون ، بتلاتها منفرجة ، خالية من البقعة الحمراء على قاعدتها من الداخل . واللوزة كبيرة الحجم ، لونها أخضر فاتح ، والغدد غير واضحة ، لها من أربعة إلى خمسة فصوص ، وعند التفتح يلاحظ أن اللوزة تيلتها بيضاء فاتحة ، تحتوى على بنور سوداء داكنة ذات أضلاع ، والحلب السرى موجود على قمتها يوضح على شكل شوكة .

أما النباتات المجن بين الهندى \times الأقطان المصرية فهى قوية النمو ، كثيرة التفرع ، أوراقها عريضة ضخمة ، قليلة التفصيص ولكنها أعمق من تفصيص الهندى ، والبقعة الحمراء واضحة عند اتصال العنق بالورقة الحمراء على قواعد بتلات ، أو ذات بقع باهتة جدا . واللوزة كبيرة الحجم وغدها تكون أحيانا غير واضحة ، لونها أخضر فاتح بها من أربعة إلى خمسة فصوص ، وعند التفتح يظهر القطن بها أبيض فاتح اللون عن الأقطان المصرية . وقد تحتفظ البنور ببقايا الحبل السرى على قمتها وأحيانا توجد خصلة قليلة جدا من الرغب في القمة .

٢ - الأقطان ذات الأوراق المجددة (شكل ٢) :

النباتات ضعيفة النمو وقصيرة عادة ، أوراقها مجعدة صغيرة الحجم يسهل تمييزها . الأزهار صفراء بها بقع بتلية حمراء صغيرة الحجم ، لوزاتها صغيرة الحجم .

٣ - نباتات الأقطان ذى التيلة الحمراء أو البنية الغامقة :

تظهر هذه النباتات في حقول القطن المصرى ولكن يصعب تمييزها خضرريا إلا عند النضج حيث تميز بلون تيلتها البنى الغامق ، فيجب جنبا على حدة واستبعادها من المحسوب .

شكل (١)

زهورات نبات هندي ، وقطن مصرى ، والطحنجن يظهرها




(٢)

(١) زهرة نبات هندي : عاجية اللون ، بتلتها منفرجة ، خالية من البقدة الحمراء على قاعدتها .

٢ - زهرة نبات قتل مصرى : صفراء باهنة اللون ، خالية أحياناً من البقدة الحمراء على قواعد البذلات ، أو ذات بقع باهنة جداً .

٣ - زهرة هندي مصرى : صفراء باهنة اللون ، خالية أحياناً من البقدة الحمراء على قواعد البذلات ، أو ذات بقع باهنة جداً .

شكل (٢) قطن مجعد الأوراق



٤ - نباتات الأقطان عديمة التفرع (شكل ٣) :

تتميز هذه الأقطان بخلو ساقها من الأفرع الشمرية ، بل تظهر الأزهار مجتمعة - كل زهرتين أو ثلاثة زهارات معا - في آباط الأوراق على الساق مباشرة ؛ والنباتات طويلة ، قليلة الأوراق لأنعدام الأفرع الشمرية ، ولكنها كبيرة الحجم .

شكل (٣) فطن عديم التفرع



ولا شك أن المبادرة باقتلاع جميع النباتات الغريبة في أطوار الفن المختلفة التي تختلف في
شكلها الظاهري نباتات الصنف المزروع ستؤدي إلى المحافظة على النقاوة العالية المرتبطة
بعطوه المحسول وصافى الحلنج والرتبة والمميزات الاقتصادية والصناعية للتبلة .