

الأنيمون

للمهندس الزراعي فتحي السنباطي

الأنيمون كوروناريا Anemone Coronaria نبات ذو جذور درنية دقيقة الحجم ، يبلغ ارتفاعه ٣٠ سم . نشأ في حوض البحر الأبيض المتوسط .
الأوراق مفصصة تفصيصاً غائراً ، والأزهار صغيرة الحجم تشبه أزهار أبو النور وهي جذابة للغاية ، مختلفة الألوان ، فمنها الأحمر والأزرق والأبيض ، والأزهار محمولة على سماريخ زهرية يختلف طولها من ١٠ - ٣٠ سم . ويرجع الأنيمون



● المهندس الزراعي فتحي السنباطي : أخصائي فلاحة البساتين
بوزارة الزراعة ، والخير بالملكة العربية السعودية .

تجاريا لإنتاج الأزهار المقطوفة في مارس وأبريل . كما يزرع في الحدائق الخاصة كنبات أصص مزهر .

الاصناف : للأنيمون سلالات رئيسية هي :

١ - St. Brigid type وهذه السلالة أكثر الاصناف انتشارا بالحدائق ،

والأزهار نصف مجوز ، مختلفة الألوان ، صالحة للقطف التجاري ، يتكاثر بسهولة بالبذور التي تزرع بالمكان المستديم مباشرة ، وتخف البادرات بعد الإنبات .

٢ - French type (De Caen type) : سلالة فاخرة ، أزهارها

مفردة أكبر من أزهار السلالة السابقة . وتزرع بذورها في الخريف وتكون جذورا متدرة في الربيع وتزهر في السنة التالية .

٣ - Anemone fulgens type (Scarlet wind flower) : الأزهار

كبيرة الحجم لونها قرمزي وسطها أسود ، وتصلح للزراعة بالحدائق الصخرية .

٤ - Dutch type : الأزهار منها المفرد والمجوز ، كبيرة الحجم صالحة

للقطف التجاري .

التربة الموافقة :

توافقه التربة الخفيفة الغنية ، ويضاف إليها كميات وافرة من الاسمدة العضوية عند إعدادها للزراعة . ويستعمل لزراعة الأنيمون في الأصص مخلوط من التربة مكون من : التربة الجيدة والسماد العضوي بنسبة ٣ : ١ .

التكاثر : يتكاثر الأنيمون بإحدى الطرق التالية :

١ - التكاثر بالبذور : وتستورد البذرة سنويا من الخارج ، وهي الطريقة

المتبعة وترجع أهمية هذه الطريقة للتكاثر إلى كثرة النباتات التي يمكن إنتاجها كل سنة من البذور ، وعدم نقل أمراض تصيب الجذور من جيل إلى آخر بالبذرة وتزهر النباتات في نفس السنة من زراعة البذرة .

ورغم أن الأنيمون يكون البذور بسهولة في الجمهورية العربية المتحدة ، إلا أن النباتات الناتجة منها لا تشابه الأصل لانعزال الصفات الوراثية ، أما البذور المستوردة من الخارج فهي هجين بين نوعين يحتفظ المنتج بسرهما ، وزراعتها تؤدي إلى إنتاج نفس الصنف المدرج في كتالوج المزرعة التي تباع البذور . وإذا

أخذنا بذرة في السنة التالية من هذه النباتات بعد زراعتها محليا تعزل العوامل الوراثية كما سبق شرحه . ولهذا يقبل الهواة والبستانيون على شراء البذرة المستوردة من الخارج ولا يكثرونها محليا .

وتزرع البذرة في أغسطس وسبتمبر في مواجير مع استعمال الطمي الخالي من المواد العضوية . وبعد الإنبات تفرد الشتلات إلى أصص قطرها ٨ سم . وبعد أن تنمو إلى حجم مناسب تنقل إلى الأرض أو إلى أصص قطرها ١٥ سم إذا أريد معاملة كنبات أصص مزهر .

٢- التكاثر بالدرنات : درنات الانيمون عبارة عن جذور متدنة كالداليا ، إلا أنها دقيقة الحجم ، وتزرع درنات الانيمون دون تفصيلها لصغر حجم الساق : وتزرع درنات الانيمون في أكتوبر وأوائل نوفمبر .

وبعترض تسكاثر الانيمون بالدرنات العوامل التالية :

- (١) تعرض الانيمون لتعفن الساق عند اتصال الجذور المتدنة به .
- (٢) يقل عدد النباتات سنة بعد الأخرى نتيجة لإصابة الجذور بالأمراض .

تجهيز التربة :

تقسم الأرض إلى حياض وتعزق عزقا غائرا وتروى ، ثم يضاف إليها السماد البلدي بمعدل مقطف سماد لكل متر مربع . ثم تعزق ثانيا ليختلط السماد بالتربة جيدا ثم يسوى سطح الحياض . وفي مزارع الأزهار التجارية يزرع الانيمون على خطوط تسكون المسافة بينها حوالي ٣٠ سم ، وسهولة تفكك تربة الخطوط عن الأحواص تجعلها بيئة أصالح للنوجذور الانيمون .

الزراعة :

سواء كان الانيمون سيزرع في الأرض أو يربي بالأصص ، تفضل زراعة الدرنات في أصيص قطره ٨ سم ، حتى يمكن موالاتها بالرى دون أن تتعفن . وبعد ظهور النوات الخضرية تنقل إلى المكان المستديم بالحياض أو على الخطوط . والمسافة بين النباتات ٢٠-٢٥ سم .

أما إذا زرعت الدرنات في الأصص فيلاحظ أن تغطي بطبقة رقيقة من التربة
فتنمو البراعم فوق سطح التربة في وقت أسرع مما لو زرعت عميقة .

الخدمة بعد الزراعة :

يراعى عدم الإفراط في رى الأنيمون قبل نمو البراعم فوق سطح التربة
حتى لا تتعفن الساق ، وبعد نمو البراعم وتسكوين ورقتين أو ثلاثة يوالى بالرى
على فترات أقصر ، لتحفظ التربة بنسبة أكبر من الرطوبة تشجع نمو الأنيمون
وأزهاره . كما تزال الحشائش فيما بين النباتات بالشقرف حتى لا تتأثر الدرنات
وهى قريبة من سطح الأرض .

موسم التزهير :

يزهر الأنيمون في الربيع المبكر (مارس وأبريل) ، ويزداد طول الأزهار
كلما تعرضت النباتات لانخفاض درجة الحرارة أثناء الليل إلى ٤°م ، ويؤدى
ارتفاعها إلى سرعة نمو الأزهار ولكن يقل طولها ، ولهذا يفضل ترك النباتات
مكشوفة حتى تتعرض لبرودة الليل في الشتاء وأوائل الربيع .

قطف الأزهار :

تقطف أزهار الأنيمون في الصباح المبكر بدون أوراق قبل اكتمال تفتحها
وتوضع مباشرة في ماء بارد بضع ساعات . بعدها تربط في حزم لا يزيد كل منها
عن ١٢ زهرة ، وتلف كل حزمة في ورق جرائد حتى لا تتسكدس الأزهار فوق
بعضها فتتشم أثناء الشحن إلى المحلات .

اقتلاع الدرنات والتخزين :

بعد جفاف الأوراق ، تدخل الدرنات طور السكون ، فتقلع وتنظف عما قد
يكون عالقا بها من التربة . وتضمر درنات الأنيمون أثناء التخزين ، ولهذا يفضل
حفظها في إناء عكم الفقل ، مع استعمال رمل جاف لتعقيمها .