

أماريليس بلادونا

للمهندس الزراعي فتحى السباطى

أماريليس بلادونا Amaryllis belladona موطنه الأصلي رأس الرجاء الصالح . وهو من الأصيل الزهرية المستديرة التى تزهو صيفا . ويعرف باسم « حشيشة الحمراء » .

الأوراق سوطية الشكل ، خضراء قائمة اللون ، يبلغ طولها من ٣٠ - ٥٠ سم وعرضها ٢ - ٣ سم ، ويحمل النبات الواحد من ٧ - ٩ أوراق . الأزهار قعبة الشكل (بوقية) تحمل فى عنقيد زهرية طرفية على طول الساق ، وتحتوى كل زهرة على ستة أجزاء مستطيلة متشابهة تقريبا ، لونها وردي خفيف ورائحتها عطرية جميلة ، والأزهار قيمة تجارية كبيرة . ويحمل النبات من ٦ - ١٢ زهرة محمولة على قبة حامل زهرى صلب يبلغ ارتفاعه من ٣٠ - ٤٥ سم ، وتظهر الأزهار قبل خروج الأوراق .

التكاثر :

يتكاثر بالأصيل ، وبصلة الأماريليس بلادونا ببصلة حقيقية يبلغ محيطها من ٨ - ١٢ سم . وأنسب ميعاد لوراعتها مارس وأبريل .

وقد تتكاثر نباتاته بالخلفة التى تفصل عن الأمهات فى مارس .

التربة الموافقة : يوجد فى التربة الخفيفة . وهو يحتاج إلى مكان دافئ مشمس .

الزراعة : تزرع الأصيل متباعدة عن بعضها البعض بحوالى ٥٠ سم وعلى عمق

٢٠ سم ، على أن يكون ظاهراً من قبة البصلة حوالى ٣ سم . أما الخلفة فتزرع متباعدة عن بعضها بحوالى ٣٠ سم .

• المهندس الزراعى فتحى السباطى : أخصائى فلاحية البساتين
بوزارة الزراعة ، والخبير بالملكة العربية السعودية .

الرى : تحتاج الأبصال عند بدء إنباتها إلى كمية وافرة من الماء (رطوبة مستمرة) وحينما تجف الأوراق ، يمنع عنها الماء إلى بدء موسم النمو (مارس) فتزوى كل أسبوع ، وبعد انتهاء الإزهار وجفاف الأوراق ، يمنع عنها الماء ثانياً .
التسميد : تسمد الأبصال سنوياً بالسماد البلدى التام التحلل .

اقتلاع الأبصال : تمسك الأبصال بعد الزراعة في مكانها مدة حوالى ٣ - ٤ سنوات بدون اقتلاع أو نقل . وأوفى ميعاد لنقلها في مكان جديد ، هو عندما تجف الأوراق .

أمريليس هالى

Ameryllis Halli

سمى هذا النبات باسم «ليكورس» نسبة إلى سيدة أغريقية تسمى (Lycoris) . وقد أدخل (Dr. G. R. Hall) — العالم الانجليزى الذى قضى شتاراً من حياته في جمع النباتات من الصين واليابان — النوع (Squamigera) إلى أمريكا من الصين .

الأوراق شريطية تظهر مبكراً في الربيع وتذبل وتختفي في أوائل الصيف ويتبعها في الظهور السوق الزهرية العارية التى يصل ارتفاعها إلى ٩٠ سم .

والأزهار بوقية الشكل عطرية الرائحة لونها قرنفلى ، وتوجد الأزهار في عناقيد زهرية . وتخرج الأزهار في أغسطس .

ومن أنواعه أيضاً النوع (Lycoris sanguinea) .

