

الأصناف الجديدة للمحاصيل الزراعية

المراد الأوصاف الفنية بمحصول الزراعة بوزارة الزراعة

القطن

يبين الجدول في الصفحة المقابلة مقارنة بين الأصناف الجديدة والأصناف المزروعة من القطن .

(١) جيزة ٧١ . تيلته من طراز الأقطان الناعمة الفائقة في المثانة (طراز جيزة ٤٤) ، نتائجها حتى الآن تدل على أنه أبجود قطن أنتجته الجمهورية العربية المتحدة ، وتشجع على البدء بإكثاره ، مساحة إكثاره ١٧ قيراطاً في سنة ١٩٦٤ ، ستقرر قيمة الصنف في السنوات القليلة القادمة على ضوء نتائجه وبعد زراعته في مساحة واسعة نوعاً واختباره على نطاق واسع بمعرفة مصانع الغزل في الداخل الخارج .

(٢) جيزة ٥٩ : من الأقطان طويلة التيلة ، طراز تيلته يقرب من طراز تيلة الكرنك مع زيادة الكبيرة في مثانة الغزل ، يتتفوق على الكرنك في الحصول ، مقاوم مقاومة شديدة جداً لمرض الذبول ، بعض شركات التصدير طلبت شراء جميع محصوله في سنة ١٩٦٣ وبغضها أبداً رغبتها في الاهتمام بسرعة نشر زراعته ، مزروع منه ١٥٠ فداناً في سنة ١٩٦٤ .

(٣) جيزة ٧٠ : من الأصناف طويلة التيلة ، طراز تيلته يقرب من طراز تيلة الكرنك مع تفوقه الكبير في مثانة الغزل ، نتائج مقارنته بالكرنك تدل على تفوقه في الحصول وصافي الحلح ولتشجع على إكثاره ، مزروع في سنة ١٩٦٤ في مساحة ٨ أفدنة ، ستقرر قيمة الصنف في السنوات القليلة القادمة بعد التوسيع في إكثاره واختباره على نطاق واسع لمعرفة رأي مصانع الغزل في الداخل والخارج .

(٤) جيزة ٦٨ : من الأقطان طويلة التيلة ، يتميز بمحصوله على الشوف وارتفاع صاف سطحه ، مبكر في النضج كالمتوافق ، شديد المقاومة جداً لمرض الذبول ، مثانة غير له تساوى أو تزيد قليلاً على المتفق ، اختبرته مصانع الغزل في الداخل والخارج ، نتائجها تشجع على إكثاره ، مزروع منه في سنة ١٩٦٤ حوالي خمسة آلاف فدان .

(٥) جيزة ٦٧ : من الأقطان الطويلة / الوسط ، ميزته على الحصول من

مقارنة الأصناف الجديدة من القطن بالأصناف المزروعة
صادر سلطنة تونس التجارب في الخس سنوات الأخيرة) ١٩٦٣ - ١٩٥٩ (

* * نتائج المقارنة بالتحليل السادس للصنف الجديد في سنة واحدة (١٩٦٣-١٩٦٤) *

القطن الوره وعلو صافى الحلح وكبر حجم اللوزة ، ويتجه الصنف إلى إعطاء رتب عالية ، اختبرته مصانع الغزل في الداخل والخارج ، تشجع النتائج على إكثاره ، مزروع في سنة ١٩٦٤ في مساحة خمسة آلاف فدان .

(٦) جيزة ٦٩ : من الأقطان الطويلة / الوسط ، ينظر إليه كبديل للجيزة ٤٤ إذ يتميز عليه بعلو الحصول وارتفاع صافى الحلح فهو أعلى الأصناف المصرية في صافى الحلح ، كما يتميز بكبر حجم اللوزة ، مزروع في سنة ١٩٦٤ في مساحة حوالي ٦٥ فدانا .

(٧) جيزة ٦٦ : من الأقطان المتوسطة التيلة ، طراز تيلته يقرب من طراز تيلة الأشموني مع زيادة الكبيرة في متانة الغزل ، استبطأ يصل محل الأشموني في مناطق زراعته بالوجه القبلي ، محصوله وصافى حلجه أعلى من محصول وصافى حلجه الأشموني ، يعطي نسبة أكبر من الرتب العالية ، اختبرته مصانع الغزل في الداخل والخارج وفضلته على الأشموني . مزروع منه حوالي ١٢ ألف فدان في سنة ١٩٦٤ .

النوع

(١) جيزة ١٤٤ : عتقة بفرازة التفريغ ، مقاوم لكل من الصدأ الأسود والبرتقالي ومقاومة للتلفم السائب والنتن ، مقاوم للرقاد . يزرع بالوجه البحري .

(٢) جيزة ١٤٥ : صنف غزير التفريغ ، مقاوم للصدأ الأسود ويتتحمل الصدأين الأصفر والبرتقالي ، مقاوم للرقاد . يزرع في الوجه البحري وخاصة بجنوب الدلتة .

(٣) جيزة ١٤٧ : مبكر النضج ، مقاوم للصدأ الأسود ، وافر الحصول ، يزرع في منطقة مصر العليا من جنوب أسيوط حتى أسوان .

(٤) جيزة ١٤٨ : مقاوم لكل من الصدأين الأسود والأصفر ، مقاوم للرقاد ويتحمل اختلاف ظروف البيئة ، ويزرع بجميع مناطق القطر ، وهو من أحسن الأصناف بمصر الوسطى .

(٥) جيرة ١٥٠ : صنف وافر المحصول، غير التفريغ، مقاوم للصداين الأسود والبرتقالي ويصاب بالصدأ الأصفر في وجود الرطوبة، يزرع بمنطقة مصر الوسطى.

الشجر

(١) بلدى ١٦ : صنف من الشعير ذى الستة صنوف، عالى المحصول، يوجد فى الوجه القبلى من أسيوط حتى أسوان.

(٢) جيزة ١١٧ : صنف من الشعير ذى الستة صنوف، عالى المحصل، يوجد ببحار الوسطى والوجه البحرى.

(٣) محراوى : صنف من الشعير ذى الستة صنوف، مبكر، يتحمل الجفاف يلازم المناطق الساحلية التى تعتمد فى زراعتها على الأمطار.

(٤) بونس : صنف من الشعير ذى الصفين يلازم صناعة المولت، يزرع بالوجه البحرى.

الذرة

(١) نهضة : عالى المحصل، يزرع بالأراضى القوية والمتوسطة الخصوبة، مقاوم لمرض الفحة والرقاد والفرط.

(٢) جيزة ١٥٩ : مقاوم لمرض الفحة، يزرع فى الأراضى الصناعية والملحية السديدة الاستصلاح.

(٣) عربى : طويل الحبوب، يزرع فى الأراضى القوية، صفات التبييض واللطيخ ممتازة.

الذرة الصاصية

١ - الأمر يكفى بدري : ينضج المحصل بعد ١١٠ يوماً ويوجد فى الأرضى الجيدة الخصوصية حيث يتتفوق على الأصناف المحلية فى الحصول بحوالى ١٥-١٠ %

وهو صنف متوسط المقاومة للأمراض الفطرية علاوة على ارتفاع نسبة الشابجوبه مما يجعلها من غوبه في عمل الخبز .

(٢) هجين مزدوج ١١٠ : هجين مستنبط من آباء محلية، يتتفوق في الحصول بحوالى ٢٥٪ على الأصناف الأخرى ، ينضج بعد حوالى ١١٠ يوما ، كايتجاوب كثيرا مع زيادة التسميد ، تجود زراعته في الأراضي الصفراء والطينية الخصبة .

(٣) هجين مزدوج ٦٧ : هجين مستنبط من آباء محلية، ماعدا السلالة ١٢٧٨ المستوردة ، يتتفوق في الحصول بحوالى ٢٥٪ على الأصناف الأخرى ، ينضج بعد حوالى ١١٠ يوما ، تجود في الأرضيات الصفراء الطينية ويتجاوب كثيرا مع التسميد .

(٤) هجين مزدوج ١٧ ع : هجين جدید مستنبط من آباء محلية ماعدا السلالة Texas 61 MS المستوردة يتميز بمحصوله العالى بحوالى ١٠٪ عن المجن الأخرى ، يماطل في نضجه هجين مزدوج ٦٧ ، ويتميز بسمولاته لاتاجه بدون التجويع إلى إجراء عملية التطويش .

المرفة الرفيعة

(١) جيزة ١١٤ : منتخب من الأصناف المحلية ، يتمتاز بكبر حبوبه وإرتفاع نسبة تصاق دقيقه مع زيادة نسبة البروتين مما يجعله صالح لعمل الخبز ، سواء بخلطه بدقيق القمح أو بدون خلاطة ، وهو مقاوم لمرض التفحّم ، ينضج بعد حوالى ١١٠ يوما ، يتتفوق في محصوله بحوالى ٢٠٪ على الأصناف المحلية ، ولونه دقيقه أبيض وكذا الخبز المصنوع منه .

الفول

(١) جيزة ١ : ومحصص لزراعته منطقة شمال الوجه البحري .

(٢) جيزة ٢ : د د جنوب الدلتا ومصر الوسطى .

(٣) ربابة ٤ : د د مصر العليا .

الله سى

جية ٩ : ومحصص لجميع مناطق زراعة العدس .

الخلبية

(١) جية ١ : ومحصص لمنطقة الوجه البحري .

(٢) جية ٢٩ : ومحصص لمنطقة مصر الوسطى .

(٣) جية ٢ : العيا .

المرصى

(١) جية ١ : ومحصص لمنطقة الوجه البحري .

(٢) جية ٢ : ومحصص لمنطقة الوجه القبلي .

المصنى

جية ١ : ومحصص لمنطقة زراعة الأصناف كبيرة المجم .

القصب

(١) كوامباتور ٢٨١ : هيكل النضج ، مرتفع في المحتويات السكرية ، إذ تصل إلى حوالي ١٥٪ ، مقاوم للصقيع والرقاد ، محصوله يزيد عن جاؤة ١٠٥ بحوالى ١٥٪ ولكن لظهور أصناف جديدة تفوقت عليه في المحصول كما نوعاً أخذت مساحتها تقل تدريجياً ، ويزرع حالياً بمنطقة مصر الوسطى ، ينجح نوعاً في الأراضي الضعيفة والشديدة التناسك بجانب تحمله للعطش .

(٢) كوامباتور ٤١٣ : متاخر النضج نوعاً ، متوسط في المحتويات السكرية إذ تبلغ ١٣٪ ، يتحمل الصقيع نوعاً ، مقاوم للرقاد ، محصوله مرتفع يتفوق

عن جاوة ١٠٥ بحوالى ٢٥٪ . يزرع حالياً في جميع مناطق القصب ولكن يفضل منطقة مصر العليا .

(٣) ناقال كوامباتور ٣١٠ : ظهر سنة ١٩٥٧ ، مبكر جداً في النضج ، يه أعلى نسبة من السكر إذ تصل إلى ١٥ - ١٦٪ ، مقاوم للرقاد كما يقاوم الصقيع بدرجة عالية ، محصوله يقارب صنف كوامباتور ٤١٣ ، يزرع حالياً في جميع مناطق القصب .

وهناك بعض السلالات الجديدة المقترنة من البذور الهجينة المستوردة بجانب بعض الأصناف المستوردة تبشر بارتفاع المحصول والمحويات السكرية .

الفول السوداني

(١) جيزة ١ : صنف منبسط ، قرونها كبيرة الحجم ، تحتوى على ثلاثة بذور غالباً ، يجود هذا الصنف في منطقة غرب الدلتا والوجه القبلي ، يعطى نسبة عالية في تصاف الحبوب ، لذلك يصلح للتصدير كفول مقشور .

(٢) جيزة ٣ : صنف منبسط من الأصناف الجديدة التي بدأ ظهورها في إكثارها عام ١٩٦٤ ، وسيوزع على الزراع ابتداء من العام القادم ، من الأصناف المعروفة تجاريًا باسم الرومي التي يقبل عليها المزارعون بمناطق الإسماعيلية والشرقية نظراً لاقبال الشركات المصدرة على هذه الأصناف ، القرون كبيرة الحجم بها بذر تان كبير تان ، يصلح للتصدير ، يتتفوق على جميع الأصناف المحلية .

الصمغ

(١) جيزة ٢٣ : يتتفوق على الأصناف المحلية ، بذوره بيضاء ، يجود وخاصة بمناطق غرب الدلتا والوجه القبلي ، تبلغ نسبة الزيت في بذوره حوالي ٥٦٪ ، يصلح لصناعة الحلواوة الطحينية .

(٢) جيزة ٢٤ : صنف بذوره حمراء مبكر النضج ، يتتفوق على الأصناف

الحلية ، وهو يجود وبخاصية بمناطق شرق الدلتا حيث يحتاج الزراع إلى صنف هميك ، نسبة الزيت في بذوره حوالي ٦٠٪ ، يصلح لصناعة استخراج الزيت .

المحروع

(١) هندي ١٢ : صنف حول يمتاز بمقاومة بذوره وارتفاع مصوّله ، تبلغ نسبة الزيت في بذوره حوالي ٤٨٪ .

(٢) هندي ٢١ : صنف معمر يمكن أن يكث في الأرض ٤ سنوات ، يمتاز بارتفاع مصوّله ومقاومة بذوره وخاصة في التجم ، ويبلغ نسبة الزيت في بذوره حوالي ٥٢٪ .

هباوه الصمسي

جيزة ١ : صنف بذوره بيضاء ، على المحصول ، نسبة الزيت في بذوره حوالي ٣٥٪ ، ويصل مصوّل الندان من البذور إلى حوالي طن .

القرطم

من المحاصيل الثانوية التي تعمل وزارة الزراعة على نشر زراعتها وخاصة في المناطق الجديدة . تمكنت الوزارة من الوصول إلى بعض السلالات التي تبشر بمصوّل عال ، وتكون نقية في الصفات الخضراء والزهرية .

البرسم

(١) مسقاوى نباتات : استنبط بالانتخاب الفردي من السلالات المحلية ، يتفوق في كمية المحصول الأخضر والحب بالوجه القبلي يعطى من ٣ - ٤ جهات .

(٢) خضراء نباتات : استنبط بالانتخاب الفردي من السلالات المحلية ، يتفوق في المحصول الأخضر والحب بالوجه البحري ، نظراً لتحمله لبرقعة الجو وزراعة المطوية مما يسمح بأخذ حشة أكثر من الصنف المسقاوى ، إذ يمكن أخذ ٤ - ٥ حشات .

(٣) صعيدي نباتات : استنبط بالانتخاب الفردى من السلالات المحلية ، يتحمل العطش مما يجعله ملائماً للزراعة بمناطق الحياض حيث يمكن أخذ حشتين منه .

(٤) فل نباتات : استنبط بالانتخاب الفردى من السلالات المحلية ، صنف قوى النمو يعطى حشة واحدة أو التقاوى ، ويتغوق على جميع الأصناف الأخرى .

محاصيل الملف الصيفية

(١) ذرة العلف السكرية جزءة ١ : استنبط بالانتخاب الفردى ، يتمتع بارتفاع نسبة المادة السكرية ، يتحمل الملوحة إلى حد ما ، مما يجعله ملائماً للمناطق الحديثة الإصلاح ، كما يوجد في الأراضي الخصبة والمتوسطة المخصوصة .

(٢) حشيشة السودان العادية جزءة ٢ : استنبط بالانتخاب الفردى تتجزأ زراعته في أغلب أنواع الأراضي .

(٣) حشيشة السودان السكرية جزءة ٣ : استنبط بالانتخاب الفردى ، يتغوق في المحصول الأخضر بجانب ارتفاع محتوياته السكرية .

السكنافه

جزءة ٤ : عالي محصول القشر والبذرة ، مقاوم لمرض الصدأ ، تتصافى الألياف عالية درجة الألياف جيدة من ناحية الصفات الفزيلية ، مبكر في النضج نوعاً .

التبول

(١) جزءة ١ : عالي المحصول من الألياف والبذور ، مبكر النضج نوعاً ، درجة الألياف جيدة .

(٢) جيزة ٢ : على الحصول من الألياف والبذور، متوسط التكثير في النضج
درجة الألياف جيدة .

(٣) جيزة ٣ : على الحصول من الألياف والبذور، متأخر النضج، درجة
الألياف جيدة .

البصل المصري

(١) جيزة ٦ : صنف استنبط بالانتخاب الفردي من السلالات الصعيدية
يتفوق في كمية الحصول بجانب تجانس شكل وحجم البصلات ، كما يصلح للتصدير
وصناعة التجفيف .

(٢) جيزة ٦ محسن : الانتخاب من الصنف جيزة ٦ ، يتفوق على الصنف
جيزة ٦ في صفات الحفظ والتخزين مع ارتفاع الحصول البصلات .